61 Q2563762 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CNJ **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - CNJ - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Ciências Sociais

Em relação aos princípios e métodos da pesquisa quantitativa e da pesquisa qualitativa, julgue o seguinte item.
Metanálise é um método de pesquisa quantitativo que permite consolidar os resultados de diferentes estudos, aumentando o poder estatístico e a confiabilidade das conclusões; ao se analisarem e combinarem dados de estudos sobre programas de ressocialização de egressos do sistema penitenciário, por exemplo, é possível chegar a uma conclusão mais consolidada sobre o tema.

- Certo
- Errado

62 Q2563763 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CNJ **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - CNJ - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Ciências Sociais

Em relação aos princípios e métodos da pesquisa quantitativa e da pesquisa qualitativa, julgue o seguinte item.
A definição clara dos objetivos é fundamental em uma pesquisa quantitativa, ao passo que, na pesquisa qualitativa, os objetivos são estabelecidos depois de a pesquisa ser iniciada, devendo evoluir à medida que o processo da pesquisa avança com novos *insights*.

- Certo
- Errado

63 Q2563764 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CNJ **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - CNJ - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Ciências Sociais

Em relação aos princípios e métodos da pesquisa quantitativa e da pesquisa qualitativa, julgue o seguinte item.
Em pesquisas quantitativas com a aplicação de métodos estatísticos para a construção de inferências sobre a população de interesse, a aleatoriedade é um aspecto crucial para se garantir a representatividade da amostra.

- Certo
- Errado

64 Q4199149 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2024 **Banca:** VUNESP **Órgão:** APS - SP **Prova:** VUNESP - 2024 - APS - SP - Medico do Trabalho

Um médico, após examinar um grupo de 500 trabalhadores para um determinado agravo à saúde, classifica o quadro de cada um como: normal; leve; moderado; ou grave. Do ponto de vista bioestatístico, a forma de medida que deve ser adotada para classificação inicial da condição da doença é a escala

(A) de intervalo.

(B) de normalidade.

(C) de regressão logística.

(D) numérica.

(E) ordinal.

65 Q2496461 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-MS **Prova:** FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística

Um estatístico realizou uma análise exploratória de dados sobre o desempenho acadêmico dos alunos de uma instituição de ensino. Ele coletou informações sobre as notas de uma avaliação e construiu um histograma para visualizar a distribuição das notas. Após a construção, o profissional observou que a distribuição era simétrica e concentrada em torno da moda.
A medida descritiva utilizada para aferir o grau de achatamento da distribuição das notas é:

(A) assimetria;

(B) curtose;

(C) mediana;

(D) média;

(E) moda.

66 Q2496463 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-MS **Prova:** FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística

A afirmação que descreve corretamente os conceitos e as relações entre variáveis quantitativas e qualitativas é:

(A) variáveis quantitativas podem ser obtidas a partir de variáveis qualitativas em situações particulares;

(B) variáveis quantitativas são características observadas em populações, enquanto variáveis qualitativas são características observadas em amostras;

(C) variáveis quantitativas são características subjetivas, enquanto variáveis qualitativas são características objetivas;

(D) variáveis quantitativas são contínuas, enquanto variáveis qualitativas são discretas;

(E) variáveis quantitativas são representadas por números inteiros.

67 Q2496464 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-MS **Prova:** FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística

A opção que apresenta uma variável qualitativa é:

(A) altura;

(B) escolaridade;

(C) idade;

(D) peso;

(E) salário.

68 Q2496465 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-MS **Prova:** FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística

Um pesquisador coletou dados sobre a idade de 1.000 pessoas em uma determinada região e organizou esses dados em uma série estatística. Ao analisar a série do tipo univariada, ele percebeu que a distribuição das idades era positivamente assimétrica.
Considerando essa informação, a afirmação correta é:

(A) a média das idades será maior que a mediana;

(B) a moda das idades poderá ser um valor com frequência igual a cinco;

(C) o intervalo interquartílico das idades será simétrico em torno da média;

(D) o terceiro quartil representa o terceiro dado ordenado crescentemente;

(E) o percentil 50 é equivalente à moda.

69 Q2496468 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-MS **Prova:** FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística

Um pesquisador está estudando a altura dos estudantes de uma universidade. Ele coletou dados e deseja classificar essa variável como discreta ou contínua.
A afirmação verdadeira em relação à natureza dessa variável é:

(A) a variável é contínua, pois são números inteiros;

(B) a variável é contínua, pois são números reais;

(C) a variável é discreta, pois são números decimais;

(D) a variável é discreta, pois são números inteiros;

(E) a variável é discreta, pois são números reais.

70 Q2554341 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Access **Órgão:** Banestes **Prova:** Instituto Access - 2024 - Banestes - Analista Econômico Financeiro - Gestão Estatística

Analise as assertivas abaixo:
I. O grau de achatamento (ou afilamento) de uma distribuição em relação a uma distribuição padrão (chamada curva normal padrão) denomina-se assimetria. II. A medida de curtose é maior do que a da distribuição normal. A curva é mais alta e mais fechada (ou mais afilada) que a curva da distribuição normalmente se denominaleptocúrtica. III. Mesocúrtica: a medida de curtos e é menor do que a da distribuição normal. A curva é mais aberta (ou mais achatada) que a curva da distribuição normal. Assinale a alternativa correta.

(A) Apenas a afirmativa II que está correta.
(B) A afirmativa I e II estão corretas.
(C) A afirmativa I e III estão corretas.
(D) Todas estão corretas.

71 Q2554344 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Access **Órgão:** Banestes **Prova:** Instituto Access - 2024 - Banestes - Analista Econômico Financeiro - Gestão Estatística

A Estatística descritiva utiliza variáveis, que são classificadas como: qualitativas e/ou quantitativas. Assinale a alternativa correta sobre a afirmação anterior.
I. Variáveis quantitativas referem-se às variáveis contínua ou discreta. II. Variáveis qualitativas referem-se às variáveis nominal ou ordinal. III. Variáveis quantitativas referem-se às variáveis nominal ou ordinal. IV. Variáveis qualitativas referem-se às variáveis contínua ou discreta. Assinale a alternativa correta.

(A) As afirmativas I e III estão corretas.
(B) As afirmativas II e IV estão corretas.
(C) As afirmativas I e II estão corretas.
(D) Todas estão corretas.

72 Q2473939 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANVISA **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANVISA - Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária - Área 1 **...**

Mauro trabalha em uma agência reguladora, na área responsável pela implantação e pelo acompanhamento das boas práticas, da qualidade regulatória e da governança regulatória.

Tendo essa situação hipotética como referência, julgue o item seguinte.

Ao realizar uma avaliação do resultado regulatório (ARR) do tipo descritiva, Mauro deve utilizar uma amostra de dados para fazer estimativas sobre a relação entre as variáveis explicativas e a variável de interesse, utilizando, por exemplo, a regressão descontínua.

◯ Certo
◯ Errado

73 Q2488059 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** MPO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - MPO - Conhecimentos gerais para todas as especialidades

Acerca de Power BI, exploração de dados e pareamento de dados (*record linkage*), julgue o próximo item.

Variáveis qualitativas são definidas por várias categorias, representando uma classificação dos indivíduos.

◯ Certo

◯ Errado

74 Q2447345 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Cálculo de Probabilidades Variável aleatória discreta , Variável aleatória contínua

Ano: 2024 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** TJ-AC **Prova:** CS-UFG - 2024 - TJ-AC - Analista Judiciário - Estatístico

Sejam X e Y variáveis aleatórias. O valor da $E(E(X|Y))$ é igual a

Ⓐ $E(X)$.

Ⓑ $E(Y)$.

Ⓒ $E(X|Y)$.

Ⓓ $E(Y|X)$.

75 Q2378161 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INPI **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - INPI - Tecnologista em propriedade industrial – área: t1 – formação: qualquer área de formação.

Na tabela a seguir, são apresentados dados relativos a depósitos de desenho industrial (DI), extraídos do Anuário Estatístico de Propriedade Industrial (PI) 2000-2019, do INPI. Os dados relativos a DI referem-se a todos os pedidos de depósito de desenhos industriais protocolados no INPI no ano de referência e inseridos na base de produção de PI até a data de extração.

ano	depósitos de DI
2000	3.563
2001	3.732
2002	4.354
2003	5.104
2004	4.967
2005	5.209
2006	5.344
2007	5.323
2008	5.990
2009	5.237
2010	6.070
2011	6.889
2012	6.682
2013	6.847
2014	6.590
2015	6.038
2016	6.027
2017	6.000
2018	6.111
2019	6.432

INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v7.0. Internet:<www.gov.br/inpi> .

Acerca das informações presentes na tabela, julgue o item seguinte.

A série de depósitos de DI apresentada é amodal.

◯ Certo

◯ Errado

76 Q2382934 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Cálculo de Probabilidades Variável aleatória discreta

Ano: 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** IPEA **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Desenvolvimento

Para fenômenos cujo resultado é um indicativo da ocorrência ou não de um fato ou escolha, utiliza-se a modelagem de variáveis discretas. Um exemplo é o estudo da participação ou não da mulher no mercado de trabalho. A variável dependente a ser modelada é derivada de um processo de escolha, realizada com base na comparação das opções disponíveis, em que o indivíduo escolhe a opção com maior utilidade/benefício. O modelo é construído a partir de uma variável auxiliar chamada latente y*. A variável y* não é observada e reflete esta utilidade/benefício, definindo o processo de escolha. Se temos uma escolha y binária
y = 1 se y* > 0 y = 0 se y* ≤ 0, a variável latente é escrita como: $y^* = x^*\beta + \varepsilon$,
onde x e β são vetores de variáveis explicativas e de parâmetros, respectivamente, e ε é o termo de erro não observado. Dessa forma, conclui-se que

(A) a forma funcional de e mais recomendável quando a amostra de dados possui valores extremos é a da distribuição normal padrão, ou seja, o modelo Probit é mais adequado.

(B) o modelo utilizado sendo Probit, tem-se que $Pr(y = 1|x) = Q(x'\beta + \varepsilon)$, onde Q é a função de distribuição acumulada de uma Normal Padrão.

(C) o método de estimação empregado para a análise da $Pr(y = 1|x)$ sempre deverá ser o de máxima verossimilhança.

(D) os parâmetros β representam os efeitos marginais das variáveis explicativas sobre a probabilidade de y = 1.

(E) os efeitos marginais sobre a $Pr(y = 1|x)$ são obtidos diretamente a partir dos b estimados do modelo de probabilidade linear.

77 Q2386933 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** PC-PE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - PC-PE - Escrivão de Polícia

Considerando um formulário com as variáveis nome, altura, idade, CPF e peso, julgue os itens a seguir.
I Nesse formulário, há quatro variáveis quantitativas e uma variável qualitativa. II A altura e o peso são exemplos de variáveis quantitativas contínuas. III Idade é um exemplo de variável qualitativa ordinal. Assinale a opção correta.

(A) Nenhum item está certo.

(B) Apenas o item II está certo.

(C) Apenas o item III está certo.

(D) Apenas os itens I e II estão certos.

(E) Apenas os itens I e III estão certos.

78 Q2353393 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Distribuições de frequência

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** DPE-PR **Prova:** Instituto Consulplan - 2024 - DPE-PR - Analista da Defensoria Pública - Estatística

Em estatística descritiva, as medidas de forma visam descrever características adicionais sobre as distribuições dos dados, complementando os aspectos representados pelas medidas de posição e de variabilidade. A assimetria e a curtose são exemplos de medidas descritivas de forma. De acordo com o exposto, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Em distribuições unimodais, observa-se a simetria quando média = mediana = moda.

(B) As distribuições mesocúrticas possuem o mesmo grau de achatamento da distribuição normal.

(C) Em distribuições unimodais, observa-se a assimetria à esquerda quando média > mediana > moda.

(D) As distribuições leptocúrticas possuem um grau de achatamento menor que o da distribuição normal.

79 Q2459195 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2024 **Banca:** Fundação CETREDE **Órgão:** Prefeitura de Caucaia - CE **Prova:** Fundação CETREDE - 2024 - Prefeitura de Caucaia - CE - Estatísitco

Uma variável aleatória é uma função que descreve os resultados de um experimento através de valores numéricos. É um exemplo de variável aleatória discreta.

(A) Resistência de um material.

(B) Concentração de CO_2 na água.

(C) Tempo de vida de um componente eletrônico.

(D) Tempo de resposta de um sistema computacional.

(E) Número de ações vendidas de uma empresa.

80 Q3539389 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Modelos lineares Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** UFS **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2024 - UFS - Engenheiro Civil - Classe E

Na realização de uma perícia que tratava da avaliação de um imóvel, o perito adotou uma variável que assumia apenas duas posições: “0” identificava imóveis em zona industrial e “1” identificava imóveis em zona residencial. Como se denomina essa variável?

(A) Variável proxy.

(B) Variável quantitativa.

(C) Variável dicotômica.

(D) Variável codificada.

(E) Variável locacional.

Respostas

61: **C** 62: **E** 63: **C** 64: **E** 65: **B** 66: **A** 67: **B** 68: **A** 69: **B** 70: **A** 71: **C** 72: **E**

73: **C** 74: **A** 75: **C** 76: **E** 77: **B** 78: **C** 79: **E** 80: **C**