Aplikacija Kyklos

NAPREDNI VODIČ



1- Znanstveni temelji

Ovdje predloženo samopromatranje odnosi se na izlučivanje sluzi (također nazvane "cervikalna sluz") koju proizvodi vrat maternice i koja teče do stidnice. Njegova svojstva tijekom ciklusa otkrio je 1953. godine dr. John Billings (australski liječnik i pionir metoda samopromatranja (BOM), a potom su mu se u znanstvenom proučavanju sluzi pridružili i dr. Evelyn Billings i prof. dr. sc. Erik Odeblad (specijalist medicinske biofizike na Sveučilištu Umea, Švedska) i prof. dr. sc. James B. Brown (specijalist endokrinologije, Novi Zeland).

Preporuča se NE tražiti sluz u rodnici, što bi za posljedicu imalo, između ostalog, iskrivljenu percepciju osjeta. Kako bi se <u>pouzdano</u> identificirala bilo koja faza ciklusa ili dan vrhunca, prednost treba dati OSJETU NA STIDNICI, A NE IZGLEDU SLUZI.

2- Razumijevanje izgleda sluzi

1	Nema sluzi Ø Ø	
2	Neprozirno bijelo ili žuto; gusto, kremasto ili grudičasto; ljepljivo (ne rastezljivo)	Sluz neestrogenskog tipa.
3	Djelomično prozirno ; malo rastezljivo	Sluz srednjeg tipa, niti potpuno neprozirna ljepljiva niti potpuno estrogenskog tipa. U većem broju slučajeva odgovara početku promjene tijekom naglog porasta estrogena, ali se može pojaviti i kao prvi znak promjene.
4	Mutno (bijelo) do prozirno; elastično	Estrogenski tip sluzi koja može biti djelomično bijela (od mutne bijele do bistre). Iskreno elastična.
5	Prozirno; rastezljivo (kao bjelanjak) ili vrlo tekuće (kao voda)	Rastezljiva, potpuno prozirna sluz, koja čak može teći iz rodnice poput vodenaste trake.
6	Osušeni, bijeli ili žuti talog	Suhi talozi na donjem rublju, u velikim ili malim količinama. Može odgovarati običnom vaginalnom iscjetku, ali i osušenoj sluzi, zbog čega se prema zadanim postavkama smatra uočenom sluzi, no može biti da to uopće nije sluz, što se može utvrditi u razgovoru s voditeljem (Napomena: razlika između toga dvojega je teška).
Sluz 3 do 5 (ili čak 6) ukazuje na dominantni utjecaj estrogena (početak ili već uspostavljeni): • predovulacijski porast estrogena, s porastom prema ovulaciji ili bez njega • epizoda dominacije estrogena nakon ovulacije (ponekad opažena u sredini ili na kraju luteinske faze)		
7	Dodatno opažanje ?	U slučaju dvojbe oko opažanja ili bilo kakvog neobičnog zapažanja, koje bi moglo biti nešto drugo osim sluzi ili čak ukazivati na infekciju (spolno prenosivu ili ne).

3- <u>Tipka Ciklusi</u> (tablica sa sažetim prikazom ciklusa)

Boje u 3. stupcu (nakon datuma), automatski prema odabranoj kombinaciji <u>osjeta u stidnici + promatranje sluzi,</u> primjenjuju se **prema zadanim postavkama dok čekaju vaše ručno tumačenje ciklusa** (vidi § 4) :

- zadano PLAVO (boja vode) = bilo kakva prisutnost vlažnosti (u OSJETU ili IZGLEDU)

 zadano ŽUTO (boja pijeska) = suho + neestrogenska vrsta sluzi (nerastezljiva neprozirna)

 zadano SMEĐE (boja zemlje) = suho + bez vidljive sluzi

 zadano BEZBOJNO = ostale situacije

 s « ? » = osjet ili izgled « ostalo »
- TAMNO CRVENO = jako krvarenje (menstruacija ili ostalo)
- CRVENO = manje obilno krvarenje (početak/kraj menstruacije; ostalo)
- SVIJETLO CRVENO = tragovi krvi, crveni ili smeđi

N.B. svaka prisutnost krvi automatski daje prednost CRVENOJ boji.

4- Funkcija Analiza ciklusa

Stupac ANALIZA, duplikat automatskog stupca BOJA, omogućuje ručno tumačenje ciklusa klikom na jedan ili više okvira za izmjenu. Izborna mogućnost, za voditeljevo tumačenje ili za napredne korisnike.

- vrhunac ciklusa, maksimalna plodnost, skora ovulacija (prepoznata retrospektivno na dan suhog osjeta nakon vrhunca plodne sluzi)
- 1, 2, 3: dana nakon vrhunca (ili nakon epizode promjene TON-a)
- sienčano /// : neplodna razdoblja (predovulacijski TON; neplodno razdoblje luteinske faze)
- : tipičan osjet i izgled za nagli porast estrogena, bez obzira vodi li to do vrhunca ili ne
- ŽUTO : suho + neelastična mutna sluz ili drugi opisi koji ukazuju na obrazac neplodnosti s iscjetkom (vidi "posebni slučajevi")
- **SMEĐE** : suho + nema sluzi ili drugi opisi koji ukazuju na obrazac neplodnosti bez iscjetka

POSEBNI SLUČAJEVI:

Brojni bezbojni okviri jer korisnik nije u stanju prepoznati osjete ("neprimjećen" osjet).

Ako bez problema primijećuješ sluz zahvaljujući vrlo karakterističnim i vrlo jasnim obrascima izlučivanja, možeš obojiti okvire samo prema sluzi, zanemarujući osjet (dok nastavljaš vježbati prepoznavanje osjeta): PLAVO za pojavu estrogenske sluzi (rastezljivo), ŽUTO za neestrogensku sluz (neprozirna, nerastezljiva) i SMEĐE za odsutnost sluzi.

Okvir s "?" jer je korisnik zabilježio "Ostalo" (osjet ili izgled). Razgovor* s voditeljem omogućit će ti razjašnjenje prirode ove "ostale" situacije i bojanje okvira u skladu s tim.

*NB isto i kada se pojavi "suhi talog", kako bi mogla razlikovati vaginalni sekret od sluzi ove ili one vrste.

TON prije ovulacije i sjenčanje: napredni korisnik u samopromatranju može identificirati svoj TON.

Podsjetnik: TON = Temeljni obrazac neplodnosti = nepromjenjivi slijed dana prije ovulacije (osjet i izgled koji ostaju isti svjedoče o neaktivnosti vrata maternice)

TON može biti:

- TON bez iscjetka: **suho + bez sluzi** (smeđi okviri --> osjenčati)



-TON kao iscjedak: suho + mutna sluz (žuti okviri --> osjenčati) ili osjećaj vlage + neprozirna sluz (prema zadanim postavkama plavi okviri zbog vlažnosti, koji mogu biti obojeni žuto i osjenčani

- N.B. slučaj TON-a: **suho + suhi talog** (neobojeni okviri):
 - a) Suhi talog je jasno identificiran kao:
 - osušena sluz: bezbojne kutije koje treba obojiti žuto i osjenčati
 - osušeni vaginalni iscjedak (bez cervikalne sluzi): neobojeni okviri koje treba obojati smeđe i osjenčati
 - b) Talog nije jasno identificiran: ostaviti neobojeno i osjenčati.

5- Tipka *Povijest*

Sažetak stupaca ANALIZA svakog ciklusa. Kliknite na broj ciklusa kako biste pristupili njegovoj sažetoj tablici Sažetak i mogli je (ponovno) analizirati ako je potrebno.

Tipka Povratak na prethodni ciklus omogućuje vam da poništite novi ciklus koji ste pogreškom stvorili, npr. tijekom krvarenja koje se pogrešno smatralo menstruacijom.