

## Kurs:Mathematik für Anwender/Teil I/26/Klausur







# Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 $\sum$

Punkte 3341254004 0 4 3 0 6 3 4 1 3 50

 $\equiv$  Inhaltsverzeichnis  $\vee$ 

#### **Aufgabe \* (3 Punkte)**

Definiere die folgenden (kursiv gedruckten) Begriffe.

1. Eine surjektive Abbildung

$$f:L\longrightarrow M.$$

2. Der Körper der komplexen Zahlen (mit den Verknüpfungen).

- 3. Der  $\mathit{Grad}$  eines Polynoms  $P \in K[X]$ , P 
  eq 0, über einem Körper K.
- 4. Die Stetigkeit einer Funktion

$$f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$$

in einem Punkt  $x \in \mathbb{R}$ .

5. Die Differenzierbarkeit einer Abbildung

$$f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$$

in einem Punkt  $a \in \mathbb{R}$ .

6. Die Determinante eines Endomorphismus

$$\varphi : V \longrightarrow V$$

auf einem endlichdimensionalen Vektorraum  $oldsymbol{V}$ .

#### Aufgabe \* (3 Punkte)

Formuliere die folgenden Sätze.

- 1. Der Satz über die algebraische Struktur der komplexen Zahlen.
- 2. Die wichtigsten Eigenschaften des natürlichen Logarithmus.
- 3. Der Satz über die mathematische Struktur der Lösungsmenge eines homogenen linearen Gleichungssystems.

#### Aufgabe (4 (1+3) Punkte)

In einer Höhle befinden sich im Innern am Ende des Ganges vier Personen. Sie haben eine Taschenlampe bei sich und der Gang ins Freie kann nur mit der Taschenlampe begangen werden. Dabei können höchstens zwei Leute gemeinsam durch den Gang gehen. Die Personen sind unterschiedlich geschickt, die erste Person benötigt eine Stunde, die zweite Person benötigt zwei Stunden, die dritte Person benötigt vier Stunden und die vierte Person benötigt fünf Stunden, um den Gang zu durchlaufen. Wenn zwei Personen gleichzeitig gehen, entscheidet die langsamere Person über die Geschwindigkeit.

- 1. Die Batterie für die Taschenlampe reicht für genau 13 Stunden. Können alle vier die Höhle verlassen?
- 2. Die Batterie für die Taschenlampe reicht für genau 12 Stunden. Können alle vier die Höhle verlassen?

#### Aufgabe \* (1 Punkt)

Professor Knopfloch ist soeben aufgestanden und noch etwas schläfrig. Er setzt sich seine zwei Kontaklinsen in seine Augen. Beim Frühstück stellt er fest, dass in seinem linken Auge keine Kontaktlinse ist. Er ist sich sicher, dass keine Kontaktlinse verloren ging, jede Kontaklinse landete in einem seiner Augen. Ist die Abbildung, die die Zuordnung an diesem Morgen der Kontaktlinsen zu den Augen beschreibt, surjektiv, injektiv, bijektiv?

#### Aufgabe \* (2 Punkte)

Ein Apfelverkäufer verkauft **2893** Äpfel für **3127** Euro. Ein zweiter Apfelverkäufer verkauft **3417** Äpfel für **3693** Euro. Welches Angebot ist günstiger?

### **Aufgabe** \* (5 (1+1+1+1+1) Punkte)

Beweise die folgenden Aussagen zu Real- und Imaginärteil von komplexen Zahlen.

- 1. z = Re (z) + Im (z)i.
- 2. Re (z+w) = Re (z) + Re (w).
- 3. Im (z + w) = Im (z) + Im (w).
- 4. Für  $r \in \mathbb{R}$  ist

$$\operatorname{Re}(rz) = r\operatorname{Re}(z) \text{ und } \operatorname{Im}(rz) = r\operatorname{Im}(z).$$

5.  $z=\mathrm{Re}\;(z)$  genau dann, wenn  $z\in\mathbb{R}$  ist, und dies ist genau dann der Fall, wenn  $\mathrm{Im}\;(z)=0$  ist.

#### Aufgabe \* (4 Punkte)

Beweise durch Induktion für alle  $n \in \mathbb{N}_+$  die Formel

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k^2 = (-1)^{n+1} rac{n(n+1)}{2} \, .$$

#### **Aufgabe** (0 Punkte)

### **Aufgabe** (0 Punkte)

#### Aufgabe \* (4 (1+3) Punkte)

1. Skizziere die Graphen der Funktionen

$$f: \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}, \ x \longmapsto x-1,$$

und

$$g\!\!:\!\mathbb{R}_+\longrightarrow\mathbb{R},\,x\longmapstorac{1}{x},$$

2. Bestimme die Schnittpunkte der beiden Graphen.

#### **Aufgabe** (0 Punkte)

#### Aufgabe \* (4 Punkte)

Beweise den Satz von Rolle.

#### Aufgabe \* (3 Punkte)

Finde die Punkte (bzw. den Punkt)  $a \in [0, \frac{\pi}{2}]$  derart, dass die Steigung der Sinusfunktion  $\sin$  in a gleich der Gesamtsteigung von  $\sin$  zwischen 0 und  $\frac{\pi}{2}$  ist.

#### **Aufgabe** (0 Punkte)

#### Aufgabe \* (6 Punkte)

Bestimme explizit die reellen 2 imes 2-Matrizen der Form

$$M=\left(egin{array}{cc} a & b \ c & d \end{array}
ight)$$

mit

$$M^2=0$$
.


#### Aufgabe \* (3 Punkte)

Bestimme die inverse Matrix zu

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

#### Aufgabe \* (4 Punkte)

Man begründe anhand des Bildes, dass zu zwei Vektoren  $(x_1,y_1)$  und  $(x_2,y_2)$  die Determinante der durch die Vektoren definierten  $2\times 2$ -Matrix mit dem Flächeninhalt des von den beiden Vektoren aufgespannten *Parallelogramms* (bis auf das Vorzeichen) übereinstimmt.



#### Aufgabe \* (1 Punkt)

Bestimme, abhängig von  $oldsymbol{a}, oldsymbol{b}, oldsymbol{c}, oldsymbol{d}$ , den Rang der Matrix

$$egin{pmatrix} a & 4b & a-c & d \ 0 & b & b^2 & b^3 \ 0 & 0 & c^2 & a^2 \ 0 & 0 & 0 & d \end{pmatrix}.$$

#### Aufgabe \* (3 Punkte)

Bestimme, ob die reelle Matrix

$$\left(egin{array}{ccc} 9 & 3 & 0 \ -5 & -1 & 0 \ 0 & 0 & 13 \end{array}
ight)$$

trigonalisierbar und ob sie diagonalisierbar ist.

Zuletzt bearbeitet vor einem Monat von Bocardodarapti

#### Wikiversity

Der Inhalt ist verfügbar unter CC BY-SA 3.0 ℃, sofern nicht anders angegeben.

Datenschutz • Klassische Ansicht