

# Lösningsskiss för tentamen – Vektorfält och klassisk fysik (FFM232)

**Tid och plats:** Måndagen den 4 januari 2016 klockan 08.30-12.30 i Maskinsalarna.

**Lösningsskiss:** Christian Forssén

Detta är enbart en skiss av den fullständiga lösningen. Det kan innebära att vissa mellansteg i uträkningarna, som egentligen är nödvändiga för en komplett lösning, inte redovisas.

1. (a)  $T(r) = \frac{s_0}{6\lambda} (a^2 - r^2) + T_0.$

(b)  $\text{Tr}(\mathbf{P}) = M_{ik}N_{ki}.$

(c)  $a = \frac{2}{\pi\varepsilon}.$

2. Vi sätter  $\Phi = C\Phi_0$  med  $C \leq 0$ . Detta ger ekvationen

$$\frac{1-C}{Ca^2}x^2 + \frac{1-C}{Ca^2}y^2 + \frac{1}{Ca^2}z^2 = 1.$$

Det finns tre olika fall:

(a)  $0 \leq C < 1$

Alla koefficienter är positiva och ekvationen beskriver en ellips med halvaxlarna  $\left(\frac{a\sqrt{C}}{\sqrt{1-C}}, \frac{a\sqrt{C}}{\sqrt{1-C}}, a\sqrt{C}\right)$

(b)  $C = 1$

Ett specialfall där ekvationen ger att  $z^2 = a^2$ , dvs  $xy$ -planen med  $z = \pm a$ .

(c)  $C > 1$

Vi skriver ekvationen som  $\frac{C-1}{Ca^2}x^2 + \frac{C-1}{Ca^2}y^2 - \frac{1}{Ca^2}z^2 = -1$ , vilket är ekvationen för en tvåmantlad hyperboloid med  $z$ -axeln som symmetriaxel och med halvaxlarna  $\left(\frac{a\sqrt{C}}{\sqrt{C-1}}, \frac{a\sqrt{C}}{\sqrt{C-1}}, a\sqrt{C}\right)$ . Genomskärningar av denna yta kan med fördel skissas för några olika värden på  $z$ .

3. Flödet kan vi skriva

$$\Phi(S) = \oint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \int_V \nabla \cdot \vec{F} dV = - \int_V \Delta\phi dV,$$

där vi har använt oss av Gauss sats ( $S = \partial V$ ). Potentialen skrivs enkelt i sfäriska koordinater  $\phi = r^4 - 3r^2$  och Laplace-operatorn ger  $-\Delta\phi = 18 - 20r^2$ . Denna funktion utgör alltså integranden för volymsintegralen och är positiv om  $r < 3/\sqrt{10}$ . Störst flöde fås alltså om vi integrerar över ytan på en sfär med radien  $r = 3/\sqrt{10}$ . Det maximala, totala flödet blir

$$\int d\Omega \int_0^{3/\sqrt{10}} (18 - 20r^2)r^2 dr = 4\pi \frac{3}{\sqrt{10}} \frac{54}{25}.$$

4. Se t.ex. avsnitt 2.2 i kompendiet

- (a)  $d\vec{r} = \sum_{i=1}^3 h_i \hat{e}_i du_i$ .
- (b) Betrakta ett skalärt fält  $f$ . Om vi förflyttar oss en sträcka  $d\vec{r}$  så förändras  $f$  med  $df = \nabla f \cdot d\vec{r}$ . Förflyttningen kan vi i de nya koordinaterna skriva som

$$d\vec{r} = h_1 \hat{e}_1 du_1 + h_2 \hat{e}_2 du_2 + h_3 \hat{e}_3 du_3.$$

Om vi skriver  $f$  som en funktion av  $u_1, u_2$  och  $u_3$  får vi

$$\begin{aligned} df &= \frac{\partial f}{\partial u_1} du_1 + \frac{\partial f}{\partial u_2} du_2 + \frac{\partial f}{\partial u_3} du_3 \\ &= \frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial u_1} h_1 du_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial u_2} h_2 du_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial u_3} h_3 du_3 \\ &= \left( \frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial u_1} \hat{e}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial u_2} \hat{e}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial u_3} \hat{e}_3 \right) \cdot d\vec{r} \end{aligned}$$

Då kan vi identifiera uttrycket inom parentes som gradienten i de nya koordinaterna  $u_1, u_2, u_3$

$$\nabla f = \frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial u_1} \hat{e}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial u_2} \hat{e}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial u_3} \hat{e}_3.$$

- (c) Skalärfältet kan skrivas  $\phi = 1/r$  och gradienten blir

$$\nabla \phi = \hat{r} \frac{\partial \phi}{\partial r} + \dots = -\frac{\hat{r}}{r^2}.$$

5. Kurvan  $C$  är en ellips med centrum i origo och halvaxlarna  $a$  och  $2a$ . Enligt högerhandsregeln väljer vi  $\hat{z}$  som normal till ellipsskivan. Fältet  $\vec{F}$  är singulärt på  $z$ -axeln. Singulariteten sitter helt i  $\vec{F}_1 = F_0 \frac{a}{\rho} \hat{\varphi}$ , som vi känner igen som en virveltråd på  $z$ -axeln med styrkan  $2\pi F_0 a$ . Vi kallar resten av fältet  $\vec{F}_2$ . Dess rotation är

$$\nabla \times \vec{F}_2 = \frac{F_0}{\rho} \begin{vmatrix} \hat{\rho} & \frac{\partial \hat{\varphi}}{\partial \rho} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \varphi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\rho \sin 2\varphi}{2a} & -\frac{\rho^2 \sin^2 \varphi}{a} & 0 \end{vmatrix} = -\frac{F_0}{a} \hat{z}.$$

Eftersom  $C$  omsluter  $z$ -axeln en gång i positiv led, ger  $\vec{F}_1$  bidraget  $2\pi F_0 a$ . Bidraget från  $\vec{F}_2$  fås med hjälp av Stokes sats som  $-F_0/a$  gånger arean av ellipsen, som är  $2\pi a^2$ . Värdet på den totala integralen är  $2\pi F_0 a - \frac{F_0}{a} 2\pi a^2 = 0$ .

- 6.
- Vektorfältet är noll inuti metallen, vilket innebär att potentialen är konstant. Vi väljer att sätta  $\phi = 0$ , vilket gör att ytan ( $z = 0$ ) blir en ekvipotentialyta med  $\phi = 0$ .
  - Detta Dirichlet randvillkor kan uppfyllas genom att införa en spegelladdning  $-q$  i punkten  $-a\hat{z}$ . Den elektriska potentialen (för  $z > 0$ ) ges av

$$\phi(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0|\vec{r} - a\hat{z}|} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0|\vec{r} + a\hat{z}|}.$$

- Det elektriska fältet ges av

$$\vec{E} = -\nabla\phi(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{\vec{r} - a\hat{z}}{|\vec{r} - a\hat{z}|^3} - \frac{\vec{r} + a\hat{z}}{|\vec{r} + a\hat{z}|^3} \right].$$

- Vid ytan är  $\vec{r} = \rho\hat{\rho}$  och  $|\vec{r} - a\hat{z}| = |\vec{r} + a\hat{z}| = \sqrt{a^2 + \rho^2}$ . Därför blir vektorfältet vid ytan  $\vec{E}_+ = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{-2a\hat{z}}{(a^2 + \rho^2)^{3/2}}$ .
- Ytladdningen motsvaras av en diskontinuitet i fältet

$$\sigma = \epsilon_0 \hat{n} \cdot (\vec{E}_+ - \vec{E}_-).$$

Här är  $\hat{n} = \hat{z}$  och  $\vec{E}_- = 0$  vilket ger  $\sigma = \frac{-qa}{2\pi(\rho^2 + a^2)^{3/2}}$ .

- Den totala inducerade laddningen fås genom att integrera över ytan

$$Q = \int_{\varphi=0}^{2\pi} d\varphi \int_{\rho=0}^{\infty} \sigma \rho d\rho = \dots = -q,$$

vilket man egentligen kan inse från det givna randvillkoret.