

Rewilding Coal Overburdens

कोयला खनन क्षेत्र का पुनर्स्थापन



An area of 4.5 ha at Amrapalai Central Coalfield Limited (CCL) overburden site, converted into a dense, green forest by planting native trees closely together (Miyawaki method), so the area quickly becomes a healthy, natural ecosystem again.

आम्रपाली कोयला खनन क्षेत्र के 4.5 हे में देशी प्रजातियों को पास-पास लगाकर (मियावाकी विधि से) खनन क्षेत्र को घने, हरे-भरे जंगल में परिवर्तित किया गया, जिससे यह क्षेत्र शीघ्र ही एक स्वस्थ, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में पुनः परिवर्तित हो जाए।

पुनर्स्थापन पूर्व स्थल की तैयारी



पुनर्स्थापन की पहली अवस्था



पुनर्स्थापन के तीन माह पश्चात



पुनर्स्थापन के छह माह पश्चात



पुनर्स्थापन के एक वर्ष पश्चात



- ✱ Established Micro-plantation (Miyawaki method) at CCL Amrapali Chatra overburden with high survival and consistent growth.
- ✱ *Albizia lebbbeck*, *Terminalia arjuna*, *Melia azedarach*, *Bombax ceiba*, and *Dalbergia sissoo* noted outperformers.
- ✱ Supports more life (birds, insects, butterfly) and creates natural habitat for them.
- ✱ Improves ecosystem balance
- ✱ Promotes flowering, fruiting and rural livelihood

- ✱ सीसीएल आम्रपाली चतरा के कोयला खनन क्षेत्र में उच्च उत्तरजीविता और निरंतर वृद्धि के साथ सूक्ष्म वृक्षारोपण (मियावाकी विधि) स्थापित किया गया।
- ✱ सफ़ेद सिरिस, अर्जुन, मेलिया, सेमल और शीशम का उच्च प्रदर्शन।
- ✱ यह पद्धति पक्षी, कीट, छोटे जानवर के लिए प्राकृतिक आवास तथा पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन स्थापित करता है।
- ✱ पुष्पन, फल और ग्रामीण आजीविका



नौ महीने में जैव विविधता एवम पारिस्थिकी परिवर्तन
Change detection after 9 months

Contact details: Dr. Yogeshwar Mishra, mishray@icfre.org