

CURSO: Agronomia

Data entrega: 23/06/2022

PROVA 01 - ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA

Nome: Giovana Nunes da Silva

RA: 211332313

1) Os dados abaixo referem-se ao peso em gramas (g) de 5 frutos de mamão de duas variedades (V1 e V2).

V1:	40	79	71	58	76
V2:	117	126	136	120	116

Com referência a esses dados, pede-se:


a) Calcular a média, a variância, o desvio padrão o erro padrão da média e os coeficientes de variação, assimetria e curtose para as duas variedades independentes;

Estatística	V1	V2
Média		
Variância		
Desvio Padrão		
Erro Padrão da Média		
Coeficiente de Variação		
Coeficiente de Assimetria		
Coeficiente de Curtose		

b) Qual das variedades os valores do peso apresentam-se mais homogêneo, por quê?

R:

2) O histograma abaixo se refere ao peso, em quilogramas, de bovinos da raça Nelore, pertencente à FCAV-UNESP (Fazenda Experimental), Jaboticabal, SP.



(Histograma meramente ilustrativo)

a) Construir a tabela de frequências com: limites superiores e inferiores das classes da figura anterior, calcular o ponto médio de cada classe, preencher com a frequência absoluta, calcular frequência relativa e calcular frequência relativa acumulada.

Classe		Ponto Médio de Classe	n_i	f_i	F_i (acumulada)
LI	LS				
		SOMATÓRIO			-----

b) Calcular a média e o desvio padrão para esses dados agrupados e, por meio do histograma, calcular o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil.

Estatísticas de Dados Agrupados	Peso (kg)
Média	
Primeiro Quartil (Q_1)	
Mediana (Segundo Quartil - Q_2)	
Terceiro Quartil (Q_3)	

3) Em uma reserva ecológica, existe uma população de cervos de 50 indivíduos, sendo que 26 desses animais são do sexo masculino. Serão capturados 11 animais, pergunta-se a probabilidade dessa captura ser:

- a) 9 macho(s) e 2 fêmea(s): $P(E) =$
- b) 10 macho(s) e 1 fêmea(s): $P(E) =$
- c) 11 macho(s) e 0 fêmea(s): $P(E) =$

4) Dados $A = \{3, 6, 9, 12, 15\}$ e $B = \{5, 10, 15, 20, 25, 30\}$ então, classifique as alternativas em V para verdadeira e F para falsa, justificando o porquê:

- () A é subconjunto de B. Justificativa:_____.
- () A é superconjunto de B. Justificativa:_____.
- () A e B são disjuntos. Justificativa:_____.
- () a interseção de A e B é vazia. Justificativa:_____.
- () a interseção de A e B não é vazia. Justificativa:_____.

5) Sejam A, B e C três conjuntos finitos. O número de elementos de $(A \cap B) = 227$, o número de elementos $(A \cap C) = 112$ e o número de elementos $(A \cap B \cap C) = 38$. Pergunta-se:

Qual o número de elementos de $A \cap (B \cup C)$. R:

6) Uma moeda é viciada de modo que a probabilidade de sair cara (H) é 0,47. Para 2 lançamentos independentes dessa moeda, determinar:

- a) O espaço amostral. $S = \{ \quad \}$
- b) A probabilidade de sair somente uma cara. $P(E) =$
- c) A probabilidade de sair pelo menos uma cara. $P(E) =$
- d) A probabilidade dos dois resultados iguais. $P(E) =$

7) Em um ensaio onde foram avaliados a incidência de tuberculose bovina e o sexo do animal, foram observados os seguintes resultados.

	Doentes (D)	Sadios (S)	Total
Machos (M)	51	8	
Fêmeas (F)	7	34	
Total			

Escolhendo-se um animal ao acaso nesse rebanho, determine as probabilidades:

a) de que o mesmo seja macho. $P(E) =$

b) de ser macho ou doente. $P(E) =$

c) de que seja macho, se o mesmo é sadio. $P(E) =$

d) os eventos M e D são independentes? Explique o porquê de sua resposta.

R:

8) Numa cidade do interior de São Paulo, próximo à divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, estima-se que cerca de 11% dos habitantes têm algum tipo de alergia. Sabe-se que 71% dos alérgicos praticam esporte, enquanto que essa porcentagem entre os não alérgicos é de 37%. Para um indivíduo escolhido ao acaso nesta cidade, obtenha a probabilidade de:

a. Não praticar esporte. $P(E) =$

b. Ser alérgico dado que não pratica esporte. $P(E) =$

9) Uma vaca, em seu período fértil, é inseminada e tem 42% de probabilidade de ficar prenha. Após esse procedimento, o animal é submetido a um forte de estresse, o qual apresenta 91% de probabilidade de interromper a gestação. Após o animal sofrer esses dois procedimentos, (inseminação e posterior estresse), qual a probabilidade da vaca estar prenha?

R: