CURSO: Agronomia Data entrega: 23/06/2022

PROVA 01 - ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA

Nome: Julia Aguiar ______ RA: 211331911

1) Os dados abaixo referem-se ao peso em gramas (g) de 5 frutos de mamão de duas variedades (V1 e V2).

V1:	35	79	30	80	60
V2 :	136	131	131	95	100

Com referência a esses dados, pede-se:


a) Calcular a média, a variância, o desvio padrão o erro padrão da média e os coeficientes de variação, assimetria e curtose para as duas variedades independentes:

Estatística	V1	V2
Média		
Variância		
Desvio Padrão		
Erro Padrão da Média		
Coeficiente de Variação		
Coeficiente de Assimetria		
Coeficiente de Curtose		

b) Oual	l das variedades	os valores do	peso apresentam-se	e mais homogêneo.	por quê?
\sim	, Qua	i das raireadaes	ob varores ao	pese apresentant s	e mais nomegenes	por que.

R:

2) O histograma abaixo se refere ao peso, em quilogramas, de bovinos da raça Nelore, pertencente à FCAV-UNESP (Fazenda Experimental), Jaboticabal, SP.



(Histograma meramente ilustrativo)

a) Construir a tabela de frequências com: limites superiores e inferiores das classes da figura anterior, calcular o ponto médio de cada classe, preencher com a frequência absoluta, calcular frequência relativa e calcular frequência relativa acumulada. Classe Ponto Médio de f_i n_i LI LS Classe (acumulada) SOMATÓRIO b) Calcular a média e o desvio padrão para esses dados agrupados e, por meio do histograma, calcular o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil. Estatísticas de Dados Agrupados Peso (kg) Média Primeiro Quartil (Q₁) Mediana (Segundo Quartil – Q2) Terceiro Quartil (Q3) 3) Em uma reserva ecológica, existe uma população de cervos de 58 indivíduos, sendo que 26 desses animais são do sexo masculino. Serão capturados 12 animais, pergunta-se a probabilidade dessa captura ser: a) 3 macho(s) e 9 fêmea(s): P(E) =b) 4 macho(s) e 8 fêmea(s): P(E) =a) 5 macha(s) a 7 fâmaa(s): V 4 p

c) 5 macho(s) e 7 femea(s): $P(E)$ –	
4) Dados A = {3, 6, 9, 12, 15} e B={5, 10, 15, 20, 25, 30} então, classifique as alternativas em para verdadeira e F para falsa, justificando o porquê:	V
() A é subconjunto de B. <i>Justificativa</i> :	- ·
() A e B são disjuntos. <i>Justificativa</i> :	- •
() a interseção de A e B é vazia. <i>Justificativa</i> :	-•
() a interseção de A e B não é vazia. <i>Justificativa</i> :	_·
5) Sejam A, B e C três conjuntos finitos. O número de elementos de $(A \cap B)=290$, o número de elementos $(A \cap C)=136$ e o número de elementos $(A \cap B \cap C)=34$. Pergunta-se: Qual o número de elementos de $A \cap (B \cup C)$. R :	ro
6) Uma moeda é viciada de modo que a probabilidade de sair cara (H) é 0,75. Para	2
lançamentos independentes dessa moeda, determinar:	
a) O espaço amostral. S = {	
b) A probabilidade de sair somente uma cara. $P(E) =$	
c) A probabilidade de sair pelo menos uma cara. $P(E) =$	
d) A probabilidade dos dois resultados iguais. $\overline{P(E)}$ =	

2

7) Em um ensaio onde foram avaliados a incidência de tuberculose bovina e o sexo do animal, foram observados os seguintes resultados.

	Doentes (D)	Sadios (S)	Total
Machos (M)	56	11	
Fêmeas (F)	6	27	
Total			

Escolhendo-se	um animal	ao acaso	nesse rebanho,	determine a	s probabilidades:
\ 1	•	1 70/			

- a) de que o mesmo seja macho. P(E) =
- b) de ser macho ou doente. P(E) =
- c) de que seja macho, se o mesmo é sadio. P(E) =

d) os eventos M e D são independentes? Explique o porquê de sua resposta.						
R:						

- 8) Numa cidade do interior de São Paulo, próximo à divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, estima-se que cerca de 12% dos habitantes têm algum tipo de alergia. Sabe-se que 52% dos alérgicos praticam esporte, enquanto que essa porcentagem entre os não alérgicos é de 39%. Para um indivíduo escolhido ao acaso nesta cidade, obtenha a probabilidade de:
 - a. Não praticar esporte. P(E) =b. Ser alérgico dado que não pratica esporte. P(E) =
- 9) Uma vaca, em seu período fértil, é inseminada e tem 66% de probabilidade de ficar prenha. Após esse procedimento, o animal é submetido a um forte de estresse, o qual apresenta 89% de probabilidade de interromper a gestação. Após o animal sofrer esses dois procedimentos, (inseminação e posterior estresse), qual a probabilidade da vaca estar prenha?

R:		