

Exercici 1

Considereu la funció $f(x) = \frac{5x}{x^2 + 1}$.

1.1. Estudieu-ne el domini i els intervals de creixement i decreixement, així com els possibles màxims i mínims locals. [1 punt]

Pista. Per al domini, mira si el denominador $x^2 + 1$ es pot anul·lar per algun valor real. Després deriva amb la regla del quocient i simplifica el numerador amb cura: és on és més fàcil equivocar-se de signe. Com que el denominador de $f'(x)$ és un quadrat (i no s'anul·la), el signe de f' depèn només del numerador. Troba'n els zeros, fes una taula de signes i decideix on f creix i on decreix; a cada canvi de monotonia hi haurà un màxim o un mínim local. Dona'n també l'ordenada, calculant-la a $f(x)$ (no a $f'(x)$).

1.2. Calculeu les equacions de totes les asímptotes d'aquesta funció (si en té) i dibuixeu un esbós de la seva gràfica. [0,75 punts]

Pista. Per a les asímptotes verticals, recorda què has vist del denominador en estudiar el domini. Per a les horitzontals, calcula $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ i $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ (compara els graus del numerador i del denominador, o divideix-los tots dos per x^2). Si n'hi ha d'horitzontals a totes dues bandes, ja no en pot haver d'obliques. Per a l'esbós, combina-ho amb l'apartat anterior: el punt de tall amb els eixos, el signe de f (pensa quin signe té el denominador) i els extrems locals. Recorda que una gràfica sí que pot tallar una asímptota horitzontal: només cal que s'hi acosti quan $x \rightarrow \pm\infty$.

1.3. Calculeu l'equació de la recta normal (és a dir, la recta perpendicular a la tangent) a la corba $y = f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 2$. [0,75 punts]

Pista. Calcula primer el punt de la corba, $(2, f(2))$, i el pendent de la tangent, $f'(2)$, aprofitant la derivada de l'apartat 1.1. La normal és perpendicular a la tangent, de manera que el seu pendent és $m = -\frac{1}{f'(2)}$: cal invertir el valor i canviar-li el signe (l'error típic és fer només una de les dues coses, o fer servir directament $f'(2)$). Acaba amb l'equació punt-pendent $y - f(2) = m(x - 2)$.