

Exercici 4 — Opció B

Considereu el pla $\pi : 2x - y + z = 5$ i el punt $P = (0, 1, 3)$.

- a) Comproveu que la distància del punt P al pla π és $\frac{\sqrt{6}}{2}$. [0,5 punts]

Pista. Aplica directament la fórmula de la distància d'un punt a un pla.

- b) Trobeu l'equació general d'un pla π_1 paral·lel a π i que passi pel punt P . Quina és la distància entre π_1 i π ? [0,75 punts]

Pista. Sabem que dos plans paral·lels tenen el mateix vector normal. Per tant, l'equació de π_1 és, doncs, $2x - y + z + D = 0$, on D és un terme independent que hauràs de determinar. Imposa que el pla passi per P i així podràs trobar el valor de D . Per poder trobar la distància entre els plans π i π_1 , observa que ja l'has calculada a l'apartat a).

- c) Trobeu l'equació general d'un segon pla π_2 , diferent de π_1 , que és paral·lel a π i que estigui a una distància $\frac{\sqrt{6}}{2}$ de π . [1,25 punts]

Pista. Com a l'apartat anterior, π_2 té la forma $2x - y + z + D = 0$. Imposa que la distància entre π i π_2 sigui $\frac{\sqrt{6}}{2}$: obtindràs una equació amb un valor absolut, que tindrà dues solucions. Una d'elles correspon a π_1 ; l'altra és, precisament, la que et convé.