

Qüestió 2

Considereu el sistema d'equacions següent:

$$\left. \begin{array}{l} 4x + 2y - z = 4 \\ x - y + kz = 3 \\ 3x + 3y = 1 \end{array} \right\},$$

on k és un paràmetre real.

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre k , i resoleu-lo per a $k = 0$. [1 punt]

Pista. Aquest apartat té dues parts: discutir i resoldre. Per discutir el sistema, escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A' , calcula $\det(A)$ i troba els valors de k que l'anul·len. Per a cadascun d'aquests valors, compara els rangs d' A i A' . I què passa amb els rangs per a la resta de valors de k ? Després resol el sistema per a $k = 0$: comprova primer si aquest valor anul·la $\det(A)$. Què et diu això sobre el tipus de sistema i el nombre de solucions?

b) Resoleu el sistema per a $k = -1$. [0,75 punts]

Pista. Recorda què has trobat a l'apartat a) per a aquest valor de k . Si és compatible indeterminat, pren una variable com a paràmetre (per exemple $x = \lambda$) i expressa les altres dues en funció de λ .

c) Per a $k = -1$, modifiqueu la tercera equació de manera que el sistema esdevingui incompatible. Justifiqueu la resposta. [0,75 punts]

Pista. Has d'aconseguir que els rangs d' A i A' no coincideixin. Aprofita el que has vist a l'apartat b) sobre la tercera equació: quina part n'has de canviar perquè el rang d' A es mantingui però el d' A' augmenti? Justifica-ho comparant els rangs.