

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Э. БАУМАНА  
Факультет информатики и систем управления  
Кафедра теоретической информатики и компьютерных технологий

Лабораторная работа №2  
по курсу «Моделирование»

«Сравнительный анализ методов решения СЛАУ (метод Гаусса, метод  
Зейделя)»

Выполнил:  
студент ИУ9-91  
Выборнов А. И.  
Руководитель:  
Домрачева А. Б.

Москва 2015

# 1. Постановка задачи

Провести сравнительный анализ методов Гаусса и Зейделя для решения СЛАУ. Реализовать оба метода.

Под решением СЛАУ подразумевается решение системы уравнений  $Ax = b$  показанной на рисунке ??.

## 2. Теоретическая часть

### 2.1. Метод Гаусса

*Метод Гаусса* — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений. Метод заключается в последовательном исключении переменных и происходит в два этапа:

1. Прямой ход — путём элементарных преобразований над строками систему приводят к ступенчатой или треугольной форме, либо устанавливают, что система несовместна.

На рисунке — ?? показана СЛАУ, приведённая к ступенчатому виду. Количество базисных переменных равно рангу матрицы  $A$ , то есть будет  $r$  базисные переменных. Пусть базисные будут переменные  $x_{j_1}, \dots, x_{j_r}$ , остальные будем называть свободными (небазисными).

Если  $\exists \beta_i \neq 0: i > r$ , то рассматриваемая система не совместна, то есть не имеет решений. Если рассматриваемая система совместна, то переходим к следующему этапу.

2. Обратный ход — необходимо выразить все получившиеся базисные переменные через небазисные и построить фундаментальную систему решений, либо, если все переменные являются базисными, то выразить в численном виде единственное решение системы линейных уравнений

На рисунке ?? показана СЛАУ, в которой базисные переменные выражены через свободные.

Если все переменные базисные — то получаем единственное решение системы путём последовательного нахождения переменных двигаясь по СЛАУ снизу вверх. Если присутствуют свободные переменные, то мы получаем бесконечное множество решений: перебираем всевозможные значения свободных переменных и находим базисные двигаясь снизу вверх.

### 2.1.1. Преимущества

- Для матриц ограниченного размера менее трудоёмкий по сравнению с другими методами.
- Позволяет однозначно установить, совместна система или нет, и если совместна, найти её решение.
- Позволяет найти ранг матрицы

### 2.1.2. Недостатки

- Не оптимален - работает за  $O(n^3)$ : существуют алгоритмы перемножения матриц работающие асимптотически быстрее.
- Вычислительно неустойчив для плохо обусловленных матриц.

## 2.2. Метод Зейделя

*Метод Зейделя* — итерационный метод решения системы линейных уравнений.

Рассмотрим матрицу  $A$  размера  $n \times n$ . Полагаем, что диагональные коэффициенты не нулевые, то есть  $\forall i \ a_{ii} \neq 0$ . Теперь решаем  $i$ -ое уравнение относительно  $x_i$ :

$$x_i = \frac{b_i - (a_{i1}x_1 + \dots + a_{i(i-1)}x_{i-1} + a_{i(i+1)}x_{i+1} + \dots + a_{in}x_n)}{a_{ii}}$$

Найдя  $x_i$  для каждого  $i$  получаем систему:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{b_1 - (a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n)}{a_{11}}, \\ x_2 = \frac{b_2 - (a_{21}x_1 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n)}{a_{22}}, \\ \dots \\ x_n = \frac{b_n - (a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{n(n-1)}x_{n-1})}{a_{nn}}. \end{cases}$$

Возьмём некоторый начальный вектор  $x^{(0)}$ . Подставив его в полученную систему мы получим  $x^{(1)}$ . Аналогично с помощью  $x^{(1)}$  находим  $x^{(2)}$ . Если будем учитывать

полученные ранее решения, то система примет вид:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{b_1 - (a_{12}x_2^{(k)} + a_{13}x_3^{(k)} + \dots + a_{1n}x_n^{(k)})}{a_{11}}, \\ x_2^{(k+1)} = \frac{b_2 - (a_{21}x_1^{(k+1)} + a_{23}x_3^{(k)} + \dots + a_{2n}x_n^{(k)})}{a_{22}}, \\ \dots \\ x_n^{(k+1)} = \frac{b_n - (a_{n1}x_1^{(k+1)} + a_{n2}x_2^{(k+1)} + \dots + a_{n(n-1)}x_{n-1}^{(k+1)})}{a_{nn}}. \end{cases}$$

Повторяя этот итерационный процесс получаем последовательность приближений:  $(x^{(0)}, x^{(1)}, \dots, x^{(k)}, \dots)$ . Если эта последовательность сходится, то  $x = \lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)}$  - является решением системы.

Разложим матрицу  $A$  на сумму матриц  $A = L + D + U$ , где  $D$  — диагональная матрица, а матрицы  $L$  и  $U$  соответственно ниже и выше диагональные матрицы. Тогда необходимое условие сходимости метода Зейделя можно записать в виде: если  $\| -(L + D)^{-1}U \| < 1$ , то метод Зейделя сходится.

### 2.2.1. Преимущества

- Быстро сходится.
- Сходимость доказана, всегда можно проверить сходится ли он.
- Одна итерация работает за  $O(n^2)$ , что на больших матрицах даёт преимущество перед методом Гаусса.

### 2.2.2. Недостатки

- Может медленно сходиться или даже расходиться на некоторых системах.

## 3. Реализация

В рамках лабораторной работы была написана программа на языке python, которая реализует методы Гаусса и Зейделя

### 3.1. Метод Гаусса

Ниже представлена метод на Python, реализующий метод Гаусса. Метод принимает на вход матрицы  $A$  и  $b$  и возвращает вектор решения  $x$ .

```
def gaussian(A, b):
```

```

n = len(A)
x = [0]*n

#A = A/b
A = [A[i]+[b[i]] for i in range(n)]

for k in range(1, n):
    for j in range(k, n):
        m = A[j][k-1]*1.0 / A[k-1][k-1]
        for i in range(n+1):
            A[j][i] -= m*A[k-1][i]

b = [A[i][n] for i in range(n)]

for i in range(n-1, -1, -1):
    b[i] -= sum(A[i][j]*x[j] for j in range(i+1, n))
    x[i] = b[i]*1.0 / A[i][i]

return x

```

### 3.2. Метод Зейделя

Ниже представлена метод на Python, реализующий метод Зейделя. Метод принимает на вход матрицы  $A$  и  $b$ , а также число  $eps$ , характеризующее точность решения, и возвращает вектор решения  $x$ .

```

def seidel(A, b, eps):
    n = len(A)

    #Ax=b
    x = [0] * n
    converge = False
    while not converge:
        p = copy.copy(x)
        for i in range(n):
            s = sum(A[i][j] * x[j] for j in range(i))
            s += sum(A[i][j] * p[j] for j in range(i+1,n))

```

```

x[i] = (b[i] - s)*1.0 / A[i][i]

converge = sqrt(sum((x[i]-p[i])**2 for i in range(n))) < eps
return x

```

## 4. Выводы

При реализации на ЭВМ метод Зейделя превосходит метод Гаусса по скорости работы, но требует дополнительной проверки на сходимость. Также, в отличие от метода Гаусса метод Зейделя позволяет находить значения с заданной точностью и уточнять полученные ранее решения.