

## Алгоритм 9 «Постреанимационная поддержка»

Появилась самостоятельная пульсация на крупных артериях

Появилось самостоятельное дыхание?

Нет

Да

Продолжать респираторную поддержку: ИВЛ с 50% O<sub>2</sub> в режиме нормовентиляции.

Продолжать респираторную поддержку: ВИВЛ с 50% O<sub>2</sub> в режиме нормовентиляции.

Выраженные нарушения ритма?

Нет

Да

Лечение аритмий по соответствующим алгоритмам

Систолическое АД выше 90 мм рт. ст.?

Нет

Да

Продолжить в/в инфузионную терапию допамином (200-400 мг) в 400 мл 0,9% раствора натрия хлорида, скорость контролируется по АД

Продолжить в/в инфузионную терапию 0,9% раствором натрия хлорида со скоростью 10-12 капель в минуту.

Седативная терапия в/в: оксибутират натрия 10 мл 20% раствора; или диазепам 2 мл 0,5% раствора; или фентанил 2 мл 0,005% раствора; или морфин 1 мл 1% раствора.

Контроль уровня глюкозы  
Гипогликемия?

Нет

Да

Глюкоза 40 мл 40% раствора в/в струйно

Доставка в ближайший стационар, имеющий реанимационное отделение