

Алгоритм 20 «Острый тромбоз артерий и глубоких вен»

Провести обследование пациента

Острая боль в конечности.
Бледность и мраморный оттенок кожных покровов.
Исчезновение чувствительности на конечности.
Понижение местной кожной температуры.
Исчезновение пульсации периферических артерий.

При присоединении клинических признаков гиповолемического шока:
- холодная, бледная, влажная кожа;
- САД менее 90 мм рт. ст., ЧСС более 100 в 1 мин, шоковый индекс более 0,7;
- SpO₂ менее 90%.

Острая боль в конечности.
Отёчность мягких тканей и повышение местной кожной температуры.
Повышение общей температуры.
Багрово-синюшная окраска конечности.
Усиление поверхностного венозного рисунка.
Пульсация периферических артерий ослабевает.

Тромбоз артерий

Алгоритм 5
«Гиповолемический шок»

Тромбоз глубоких вен

Венозный доступ (не на пораженной конечности), ввести:
- 1 мл 1% раствора морфина или 1 мл 2% раствора тримеперидина в/в;
- в/в раствор дроптаверина 2 мл с 1 мл 1% раствора дифентидрамина;
- п/к 5000-10000 ЕД гепарина;
- в/в 400 мл раствора декстрана/натрия хлорида или 5% раствора гидроксиэтилкрахмала или 0,9% раствора натрия хлорида. Иммобилизация конечности, положение лежа.

Ввести: 1мл 1% раствора морфина или 1 мл 2% раствора тримеперидина в/в;
- в/в раствор дроптаверина 2 мл с 1 мл 1% раствора дифентидрамина;
- п/к 5000-10000 ЕД гепарина;
Наложить на конечность тугую повязку.
Иммобилизация, возвышенное положение конечности.

Доставка в стационар по профилю основного заболевания