Алгоритм 48 «Утопление» Наложение шейного воротника, очистка верхних дыхательных путей и обеспечение адекватного дыхания Провести обследование Нет нарушения Оглушение, Признаки сознания сопор, кома клинической смерти Ингаляция кислорода, Ингаляция кислорода. Алгоритм 4 «Внезапная смерть, сердечносогревание. При необходимости – интубация трахеи или комбитюб (ларингиальная Антигипоксанты (аскормаска) биновая кислота 5% - 0.3 и ВВЛ 50% О2. мл/10кг в/в, эмоксипин 3% -Раствор гидроксиэтилкрахмала 6% - 500 мл 5-10мл в/в). в/в. Раствор глюкозы 5%-400 мл в/в. Натрия гидрокарбонат 4%-200 мл в/в. Раствор гидроксиэтилкрах-

мала 6% - 500 мл в/в.

Раствор глюкозы 5% - 400 мл B/B.

При возбуждении – диазепам 0,5% - 2-4 мл (далее по 2 мл в/в до получения эффекта). Преднизолон 120 - 300 мг

(дексаметазон 12 - 20 мг) в/в. Фуросемид 20-40 мг в/в.

Антигипоксанты: аскорбиновая кислота 5%-2 мл в/в; эмоксипин 3%-5-10 мл в/в.

При возбуждении: диазепам 0,5% - 2-4 мл в/в (далее по 2 мл в/в до получения эффекта), натрия оксибутират 20% - 10-20 мл в/в капельно в 5% растворе глюкозы.

Преднизолон 120 - 300 мг (дексаметазон 12-20 мг) B/B.

Фуросемид 20-40 мг (1% - 2-4 мл) в/в.

Доставка в ОИТАР стационара

Доставка в ОИТАР стационара под контролем жизненно важных функций, минуя приемное отделение