

## Алгоритм 78 «Алкогольная интоксикация»

Определяются патологические изменения в психической сфере и поведении, вегето-сосудистой регуляции, имеются ли двигательные нарушения, запах алкоголя изо рта. Определяются пары алкоголя в выдыхаемом воздухе (при использовании приборов) в концентрации соответствующей алкогольному опьянению (при несоответствии – алгоритм 49).

Незначительные изменения в психостатусе.  
Гиперемия кожи и слизистых, усиление потливости.  
Тахикардия.  
Изменения походки, неустойчивость в позе Ромберга.

Легкая степень

Выраженные изменения психостатуса (неадекватность поведения и ориентации).  
Усиленная потливость, слюнотечение.  
Расширение зрачков.  
Тахикардия, учащение дыхания.  
Выраженная дизартрия, отчетливые нарушения координации движения.

Средняя степень

Выраженные нарушения сознания или его отсутствие (при необходимости использовать алгоритм 27 «Кома неясного генеза»).

Артериальная гипотония. Бледность кожи, потливость.  
Слабая реакция зрачков на свет. Тяжелые двигательные нарушения (неспособность самостоятельно стоять).  
При отсутствии выраженных клинических проявлений, но наличия в анамнезе употребления значительного количества алкоголя (до 2 часов с момента употребления).

Тяжелая степень

При отсутствии признаков травмы, пациент оставляется дома, в общественных местах передается сотрудникам органов внутренних дел.

Симптоматическая терапия

Доставка в стационар по профилю основного заболевания

Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей.  
Контроль вены. Инфузионная терапия – 250-500 мл раствора натрия хлорида или 5% раствора глюкозы в/вено.  
Симптоматическая терапия.  
При необходимости напоскон 1-2 мл 0,5% раствора в/вено.

Доставка в стационар по профилю основного заболевания в положении на боку