

Алгоритм 57 «Мигрень»

Головная боль (чаще односторонней локализации).
Фото- и фонофобия.
Тошнота, рвота.
Озноб, повышенная потливость.

Дифференциальная диагностика:

- ОНМК, субарахноидальное кровоизлияние;
- менингит;
- энцефалит;
- синусит;
- острая гипертоническая энцефалопатия;
- внутричерепная гематома;
- объемный процесс.

АД, ЧСС, ЧД,
ЭКГ,
термометрия,
очаговые симптомы

Наличие
очаговых
симптомов

Алгоритм 30
«Острое нарушение
мозгового кровообращения»

Метамизол 50% – 2-4 мл в/в или кеторолак 3%
- 1 мл, в/в (в/м).
По показаниям:
- диазепам 5-10 мг (1-2 мл 0,5% раствора) в/м;
- метоклопрамид 0,5% - 2 мл в/м.

Серия тяжелых, следующих друг за другом приступов (с интервалом менее 4 часов), сопровождающихся многократной рвотой. Один тяжелый, продолжающийся более 72 часов, приступ, который не купируется с помощью ранее применявшихся болеутоляющих лекарственных средств.

Да

мигренозный статус

преднизолон 60-75 мг в/в струйно

Доставка в стационар по профилю
основного заболевания

Нет

Рекомендовать дообследование и
лечение у невролога в поликлинике
по месту жительства