

## Алгоритм 49 «Отравление неизвестным ядом»

Коррекция угрожаемых жизни нарушений дыхания (обеспечить проходимость верхних дыхательных путей) и кровообращения (при необходимости – ЛСР)



Прекратить дальнейшее поступление яда в организм:

- при ингаляционных отравлениях – удалить пострадавшего из заражённой атмосферы (сотрудник МЧС);
- при пероральном – промыть желудок через зонд, ввести энтеросорбент;
- при кожном – обмывание поражённых участков кожи водой (температура не выше 18°C).



Положение – в зависимости от уровня сознания



Контроль вены, 0,9% р-р натрия хлорида 250-500 мл в/в, пульсоксиметрия



Ингаляция кислорода – 4-6 л/мин



Симптоматическая терапия



Доставка в ОИТАР стационара

Примечание.

1. Помнить о самозащите (работать в перчатках и маске).
2. При подозрении на отравление – немедленное решение вопроса об интубации трахеи или комбитьюб (ларингиальная маска).
3. При необходимости – СЛР.
4. Активированный уголь – противопоказан при отравлении кислотами и щелочами.
5. Чётко собрать токсикологический анамнез, проанализировать токсикологическую ситуацию, при возможности собрать и сохранить остатки ядовитого вещества.