

# Алгоритм 56 «Вертеброгенный болевой синдром (боль в позвоночнике, иррадиация, тоническое напряжение мышц)»

## Исключить:

- расслаивающую аневризму аорты;
- инфаркт миокарда;
- субарахноидальное кровоизлияние;
- травматическое повреждение;
- «острый живот».

## См. алгоритмы:

- 19 «Расслаивающая аневризма аорты»;
- 15 «Острый коронарный синдром»;
- 30 «Острое нарушение мозгового кровообращения»;
- 40 «Травма позвоночника»;
- 38 «Острая хирургическая патология органов брюшной полости».

## Мероприятия:

- сбор анамнеза;
- осмотр и пальпация позвоночника;
- определение подвижности позвоночника;
- оценка симптомов натяжения;
- оценка силы мышц;
- оценка функции тазовых органов;
- оценка очаговых симптомов.

## Ввести:

- метамизол 50% – 2-4 мл в/в с 1 мл 1% раствора дифенгидрамина или кеторолак 30 мг (3% - 1 мл) в/м или в/в, или трамадол 50-100 мг (1-2 мл 5% раствора) в/м или в/в;
- при интенсивной боли дополнительно диазепам 5-10 мг (1-2 мл 0,5% раствора) в/м.

Да

Выраженный болевой синдром.  
Нарушение функции тазовых органов.  
Компрессия спино-мозговых корешков  
(пара- или тетрапарезы).

Нет

Доставка в стационар  
по профилю основного  
заболевания

Рекомендовать дообследование и лечение у невролога в  
поликлинике по месту жительства