

Алгоритм 7 «Асистолия»

Осуществлять основные реанимационные мероприятия (ИВЛ мешком Амбу, закрытый массаж сердца).
Интубация трахеи (комбитюб, ларингиальная маска).
Венозный доступ.
ЭКГ (подтвердить отсутствие электрической активности не менее чем в двух отведениях).

Наружная ЭКС с одновременным введением лекарств
(при наличии соответствующего оборудования)

Атропин 1 мг (1 мл 0,1% раствора) в/в струйно (но не более 3-х раз), чередовать с эпинефрином 1 мг (1 мл 0,18% раствора) в/в струйно быстро каждые 3-5 минут.
Повторная запись ЭКГ.

Искать устранимую причину и попытаться её купировать:

- гипоксия (оксигенотерапия под контролем SpO_2);
- ацидоз (алкогольное отравление тяжелое, длительная СЛР более 20 мин) – 8,4 % раствор натрия гидрокарбоната в/в по 20 мл;
- передозировка лекарственных средств (при уточнении введение имеющихся антидотов);
- гипотермия (согревание теплыми инфузионными растворами в/в, внешнее обогревание).

Достигнутый эффект

Асистолия

Появление эффективного ритма

Электрическая активность
(фибрилляция)

Констатация биологической смерти при неэффективности СЛР

Алгоритм 9
«Постреанимационная поддержка», устранение вновь выявленных причин

Алгоритм 6 «Фибрилляция желудочков, желудочковая тахикардия с острой сердечной недостаточностью»