АЛГОРИТМ

действий при анафилактических реакциях

Диагноз – ищите: острое начало заболевания, угрожающие жизни расстройства со стороны ДП, внешнего дыхания и/или гемодинамики, характерные кожные проявления



Вызов помощи: уложить пациента на спину на твердую поверхность, поднять ноги вверх (если позволяет дыхание)



Адреналин



При наличии соответствующих навыков и оборудования

Обеспечить проходимость ДП, Высокий поток кислорода, инфузионнная нагрузка антигистаминные, глюкокортикоиды Мониторинг Пульсоксиметрия ЭКГ,АД

Эпинефрин внутримышечно каждые 5 мин., если нет улучшения. дети до 12 лет и взрослые 500 мкг внутримышечно (0,5 мл) дети от 6 лет до 6 месяцев 150 мкг внутримышечно (0,3 мл) младше 6 месяцев 100—150 мкг внутримышечно (0,15 мл) Эпинефрин внутривенно только опытными специалистами

Титрование: взрослые – 50 мкг, дети – 1 мкг/кг

Инфузионная нагрузка (солевой раствор): Взрослые – 500–1000 мл Дети - 20 мл/кг Прекратить введение коллоидов

Внутривенно или внутримышечно	Хлоропирамии	н Клемастин	Преднизолон	Метилпреднизолон	Дексаметазон
Взрослые и дети старше 12 лет:	20 мг	2 мг	1-3 мг/кг	согласно эквивал	ентным дозам
Дети 6-12 лет:	10-20 мг	25/мкг/кг/с 2 ј	р 2–5 мг/кг	1 мг/кг	0,2-0,5 Me/kg
Дети 6 месяцев – 6 лет:	5-10 мг	25/мкг/кг/с 2	р 2-5 мг/кг	1 мг/кг	0,2-0,5 мг/кг
Дети 1-6 месяцев:	5 мг	25/мкг/кг/с/2	р 2-5 мг/кг	1 мг/кг	0,2-0,5 Me/kg