Алгоритм 65 «Кровотечение в послеродовом периоде» Период после родов Ранний послеродовый период Поздний послеродовый период (24 часа после родов) (от 24 часов после родов до 42 дней) Кровопотеря более 350 мл: Признаки определение АД, пульсометрия. гиповолемического шока Нет Да Алгоритм 5 «Гиповолемический шок» Послед отделился Послед не отделился Матка мягкая, Есть признаки отдерасслабленная Нет припри ления: надавзнаков OTливании нал лоном деления понаружный отрезок В/в окситоцин следа более пуповины не втяги-5-10 ЕД в 5% 30 мин. вается. растворе изнаков гиповолемического шока глюкозы, 0,9% Нет наружного кровотечения и раствор натрия 1. Вывести мочу катехлорида 250-Есть тером; 500 мл 2. В/в окситоцин 5-10 наружное ЕД в 5% растворе кровоглюкозы, 0,9% течение раствор натрия хлорида 250-500 мл; 3. Выделить послед наружными приема-МИ. Признаки Нет эффекта от наружных гиповолемического шока приемов – перейти на ручное отделение последа Предупредить ближайший стационар по профилю заболевания о поступлении тяжелой родильницы Доставка в стационар по профилю заболевания Доставка в стационар по профилю заболевания