

Алгоритм 25 «Стеноз гортани»

Молниеносные стенозы, обусловленные крупными инородными телами

Поперхивание и кашель (при приёме пищи, во время игры), посинение, остановка дыхания, периодический кашель при перемене положения туловища, шумное дыхание

У взрослых использовать приём Хеймлика (у пациентов без сознания проводится в положении лежа). Немедленная интубация или любой вид горлосечения: коникотомия, крикотомия, трахеотомия.

Острые стенозы

I степень

Небольшая одышка, незначительный цианоз во время беспокойства, АД – нормальное или повышено

Оксигенотерапия 100-40% воздушно-кислородной смесью. Гидрокортизон 50 мг в/м.

Небулайзерная терапия: фенотерол с ипратропиум бромидом 1-4 мл или 20-80 капель.

II степень

Одышка в состоянии покоя, в дыхании участвуют вспомогательные мышцы, цианоз слизистых полости рта, ушей, пальцев, кожи носогубного треугольника, пульс учащён, АД повышено

Оксигенотерапия: 100-40% воздушно-кислородной смесью. Преднизолон 30 мг в/в, гидрокортизон 100 мг в/м.

III степень

Резкая одышка, иногда патологическое дыхание, в акте дыхания участвуют вспомогательные мышцы, резко учащён пульс, АД снижено, тотальный цианоз, может быть нарушено сознание и судороги

Оксигенотерапия 100-40% воздушно-кислородной смесью. Преднизолон 30 мг в/в, гидрокортизон 100 мг в/м. Орошение слизистых носа, полости рта и глотки 0,18% раствором эпинефрина 1 мл.

При асфиксии: немедленная интубация или любой вид горлосечения: коникотомия, крикотомия, трахеотомия

Экстренная доставка в стационар