Prof. F. Bottacin, M. Candilera, E. Detomi, R. Colpi, M. Imbesi, S. Di Ruzza

2º compitino — 5 giugno 2018

Esercizio 1. Sia $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ una funzione lineare il cui polinomio caratteristico è x(x+2)(x-3). Disponendo solo di questa informazione è possibile determinare le dimensioni del nucleo e dell'immagine di f? In caso di risposta affermativa quali sono queste dimensioni?

Esercizio 2. Siano A e B due matrici quadrate di ordine n tali che AB = BA. Sia v un autovettore di A associato all'autovalore λ e sia w = Bv. Dimostrare che anche w è un autovettore di A associato allo stesso autovalore λ .

Esercizio 3. Si consideri la matrice

$$A_t = \begin{pmatrix} -1 & 2 & t \\ 2 & 0 & -2 \\ t & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

- (a) Determinare il valore di t per cui la matrice A_t ha un autovalore = 0.
- (b) Per il valore di t trovato nel punto (a) determinare gli autovalori e gli autospazi di A_t .
- (c) Per il valore di t trovato nel punto (a) determinare, se possibile, una matrice invertibile P tale che $P^T A_t P$ sia una matrice diagonale.

Esercizio 4. Sia $U \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio vettoriale generato dai vettori $u_1 = (2, 0, 1, -1), u_2 = (1, 1, 0, 3).$

- (a) Trovare una base ortogonale di U.
- (b) Trovare una base di U^{\perp} .

Esercizio 5. Nello spazio affine $\mathbb{A}^3_{\mathbb{R}}$ sono assegnati il piano $\pi: x+y-z+1=0$ e la retta

$$r: \begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ y - z + 2 = 0 \end{cases}$$

- (a) Sia $A = r \cap \pi$. Scrivere le equazioni parametriche della retta s passante per il punto A, contenuta nel piano π e ortogonale alla retta r.
- (b) Scrivere le equazioni parametriche della retta t passante per il punto B=(1,1,0), parallela al piano π e incidente la retta r.

Prof. F. Bottacin, M. Candilera, E. Detomi, R. Colpi, M. Imbesi, S. Di Ruzza

2º compitino — 5 giugno 2018

Esercizio 1. Sia $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ una funzione lineare il cui polinomio caratteristico è x(x+3)(x-1). Disponendo solo di questa informazione è possibile determinare le dimensioni del nucleo e dell'immagine di f? In caso di risposta affermativa quali sono queste dimensioni?

Esercizio 2. Siano A e B due matrici quadrate di ordine n tali che AB = BA. Sia v un autovettore di A associato all'autovalore λ e sia w = Bv. Dimostrare che anche w è un autovettore di A associato allo stesso autovalore λ .

Esercizio 3. Si consideri la matrice

$$A_t = \begin{pmatrix} 1 & t & 2 \\ t & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

- (a) Determinare il valore di t per cui la matrice A_t ha un autovalore = 0.
- (b) Per il valore di t trovato nel punto (a) determinare gli autovalori e gli autospazi di A_t .
- (c) Per il valore di t trovato nel punto (a) determinare, se possibile, una matrice invertibile P tale che $P^T A_t P$ sia una matrice diagonale.

Esercizio 4. Sia $U \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio vettoriale generato dai vettori $u_1 = (3, -1, 0, 1), u_2 = (1, 1, 2, 0).$

- (a) Trovare una base ortogonale di U.
- (b) Trovare una base di U^{\perp} .

Esercizio 5. Nello spazio affine $\mathbb{A}^3_{\mathbb{R}}$ sono assegnati il piano $\pi: x-y+z=0$ e la retta

$$r: \begin{cases} x+y+3 = 0 \\ y-2z+3 = 0 \end{cases}$$

- (a) Sia $A = r \cap \pi$. Scrivere le equazioni parametriche della retta s passante per il punto A, contenuta nel piano π e ortogonale alla retta r.
- (b) Scrivere le equazioni parametriche della retta t passante per il punto B=(1,0,2), parallela al piano π e incidente la retta r.

Prof. F. Bottacin, M. Candilera, E. Detomi, R. Colpi, M. Imbesi, S. Di Ruzza

2º compitino — 5 giugno 2018

Esercizio 1. Sia $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ una funzione lineare il cui polinomio caratteristico è x(x-2)(x+4). Disponendo solo di questa informazione è possibile determinare le dimensioni del nucleo e dell'immagine di f? In caso di risposta affermativa quali sono queste dimensioni?

Esercizio 2. Siano A e B due matrici quadrate di ordine n tali che AB = BA. Sia v un autovettore di A associato all'autovalore λ e sia w = Bv. Dimostrare che anche w è un autovettore di A associato allo stesso autovalore λ .

Esercizio 3. Si consideri la matrice

$$A_t = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & t \\ -2 & t & -1 \end{pmatrix}$$

- (a) Determinare il valore di t per cui la matrice A_t ha un autovalore = 0.
- (b) Per il valore di t trovato nel punto (a) determinare gli autovalori e gli autospazi di A_t .
- (c) Per il valore di t trovato nel punto (a) determinare, se possibile, una matrice invertibile P tale che $P^T A_t P$ sia una matrice diagonale.

Esercizio 4. Sia $U \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio vettoriale generato dai vettori $u_1 = (0, 2, -1, 2), u_2 = (1, 2, 0, -1).$

- (a) Trovare una base ortogonale di U.
- (b) Trovare una base di U^{\perp} .

Esercizio 5. Nello spazio affine $\mathbb{A}^3_{\mathbb{R}}$ sono assegnati il piano $\pi: x-y-z-1=0$ e la retta

$$r: \begin{cases} x - z - 2 = 0 \\ y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

- (a) Sia $A = r \cap \pi$. Scrivere le equazioni parametriche della retta s passante per il punto A, contenuta nel piano π e ortogonale alla retta r.
- (b) Scrivere le equazioni parametriche della retta t passante per il punto B=(0,1,1), parallela al piano π e incidente la retta r.

Prof. F. Bottacin, M. Candilera, E. Detomi, R. Colpi, M. Imbesi, S. Di Ruzza

2º compitino — 5 giugno 2018

Esercizio 1. Sia $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ una funzione lineare il cui polinomio caratteristico è x(x+4)(x-1). Disponendo solo di questa informazione è possibile determinare le dimensioni del nucleo e dell'immagine di f? In caso di risposta affermativa quali sono queste dimensioni?

Esercizio 2. Siano A e B due matrici quadrate di ordine n tali che AB = BA. Sia v un autovettore di A associato all'autovalore λ e sia w = Bv. Dimostrare che anche w è un autovettore di A associato allo stesso autovalore λ .

Esercizio 3. Si consideri la matrice

$$A_t = \begin{pmatrix} -2 & t & -4 \\ t & -2 & 4 \\ -4 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

- (a) Determinare il valore di t per cui la matrice A_t ha un autovalore = 0.
- (b) Per il valore di t trovato nel punto (a) determinare gli autovalori e gli autospazi di A_t .
- (c) Per il valore di t trovato nel punto (a) determinare, se possibile, una matrice invertibile P tale che $P^T A_t P$ sia una matrice diagonale.

Esercizio 4. Sia $U \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio vettoriale generato dai vettori $u_1 = (2, -2, -1, 0),$ $u_2 = (3, 0, 2, 1).$

- (a) Trovare una base ortogonale di U.
- (b) Trovare una base di U^{\perp} .

Esercizio 5. Nello spazio affine $\mathbb{A}^3_{\mathbb{R}}$ sono assegnati il piano $\pi: x+y-z=0$ e la retta

$$r: \begin{cases} 2x - z - 3 = 0 \\ y + z + 3 = 0 \end{cases}$$

- (a) Sia $A = r \cap \pi$. Scrivere le equazioni parametriche della retta s passante per il punto A, contenuta nel piano π e ortogonale alla retta r.
- (b) Scrivere le equazioni parametriche della retta t passante per il punto B=(2,1,0), parallela al piano π e incidente la retta r.