



$$m_B = m = 10 \text{ kg}$$

$$F_A = ? \text{ statico}$$




$$T_B = mg$$

$$T_B = 2T_A$$

$$\Rightarrow T_A = \frac{T_B}{2} = \frac{1}{2} mg$$

$$F_A = T_A = \frac{1}{2} mg = 49 \text{ N}$$






$$m_A = m_B = m = 10 \text{ kg}$$

$$a_A = ?$$

$$a_B = ?$$




$$\rightarrow 2T_A - T_B = m_c a_c = 0$$

$$\boxed{T_A = \frac{T_B}{2}}$$

$$\begin{cases} T_B - mg = m a_B \\ mg - T_A = m a_A \end{cases}$$





$$QP = 2x + \cancel{\pi R} = 2x' + \cancel{\pi R} + \Delta x$$

$$\Rightarrow x - x' = \frac{1}{2} \Delta x \Rightarrow \Delta x_B = \frac{1}{2} \Delta x_\Delta$$

$$\Rightarrow v_B = \frac{1}{2} v_\Delta \Rightarrow \boxed{a_B = \frac{1}{2} a_\Delta}$$

$$\begin{cases} T_B - mg = m a_B \\ mg - T_A = m a_A \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2T_A - mg = m \frac{a_A}{2} \\ [mg - T_A = m a_A] \times 2 \end{cases}$$


---


$$mg = \frac{5}{2} m a_A$$

$$\Rightarrow \boxed{a_A = \frac{2}{5} g}$$

$$\boxed{a_B = \frac{1}{5} g}$$