

## Esercizi di Algebra Lineare e Geometria-Foglio 1

1. Sia  $\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$  lo spazio vettoriale dei polinomi nell'indeterminata  $x$  a coefficienti reali, di grado minore o uguale a 3. Si considerino i sottoinsiemi

$$S_1 = \{p(x) \in \mathbb{R}_{\leq 3}[x] : p(1) = 0\}$$

(ovvero l'insieme dei polinomi che ammettono 1 come radice) e

$$S_2 = \{p(x) \in \mathbb{R}_{\leq 3}[x] : p(2) = 3\}.$$

Stabilire se  $S_1, S_2$  sono sottospazi vettoriali di  $\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$  e, in caso affermativo, determinare la dimensione e una base.

2. Sia  $V$  uno spazio vettoriale finitamente generato con  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  e sia  $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$  una base di  $V$ . Determinare la dimensione e una base del sottospazio  $W$  di  $V$  generato dai vettori

$$w_1 = v_1 - v_3 + v_4; \quad w_2 = 2v_2 + v_3 - v_4; \quad w_3 = 2v_1 + 2v_2 - v_3 + v_4$$

3. Siano

$$V = \mathcal{L}((1, 0, 3, 1), (1, 2, 0, 0))$$

$$W = \mathcal{L}((2, 0, 0, 1), (0, 2, 3, 0))$$

due sottospazi di  $\mathbb{R}^4$ . Determinare una base per  $V \cap W$ .

4. Si considerino in  $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$  (lo spazio vettoriale dei polinomi nell'indeterminata  $x$  a coefficienti reali, di grado minore o uguale a 2) i sottospazi  $U = \mathcal{L}(u_1(x), u_2(x))$  e  $W = \mathcal{L}(w_1(x), w_2(x))$  con  $u_1(x) = x^2 + 2x$ ,  $u_2(x) = x + 1$ ,  $w_1(x) = x + 2$  e  $w_2(x) = -x^2 + 1$ . Determinare  $U \cap W$  e  $U + W$ .