"gravità"

$$\bar{F} = m\bar{a} \qquad \bar{F}_G = -\gamma \frac{m\,m'}{r^2}\,\bar{u}_r$$

"inerzia"

↳ $m_I \rightarrow$ massa inerziale

$m_G \rightarrow$ massa gravitazionale

$$P = \cancel{m_I}\, g = \gamma \frac{m_{IT}\,\cancel{m_I}}{r_T^2} \Rightarrow \boxed{g = \gamma \frac{m_{IT}}{r_T^2}} \qquad \underline{\underline{OK}}$$

$$m_G = c\, m_I$$

$$P = \gamma \frac{m_{IT}\, m_I}{r_T^2} = \gamma \frac{\frac{m_{GT}}{c}\,\frac{m_G}{c}}{r_T^2} = \frac{\gamma}{c^2}\,\frac{m_{GT}\, m_G}{r_T^2} =$$

$$= \gamma^* \frac{m_{GT}\, m_G}{r_T^2} \Rightarrow \boxed{\bar{F}_G = -\gamma^* \frac{m_G\, m_G'}{r^2}\,\bar{u}_r}$$

$$P = \gamma^* \frac{m_{GT}\, m_G}{r_T^2} = m_I\, g \Rightarrow \boxed{g = \gamma^* \frac{m_{GT}\, m_G}{r_T^2\, m_I}} =$$

$$= \frac{\gamma}{\cancel{c^2}}\,\frac{\cancel{c}\, m_{IT}}{r_T^2}\,\cancel{c} = \underline{\underline{\gamma \frac{m_{IT}}{r_T^2}}} \qquad g' \frac{m_G}{m_I}$$

$$C = \frac{m_G}{m_I} = 1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\gamma^* = \gamma} \quad \boxed{m_G = m_I}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g'} \frac{m_I}{m_G}}$$

$$\boxed{\frac{m_G}{m_I} = \text{cost}}$$ Principio di equivalenza