

Функциональный анализ 6 семестр
Конспект лекций Додонова Н. Ю.

shared with ♥ by artemZholus

Содержание

1	Сопряженный оператор	2
2	Ортогональное дополнение в банаховых пространствах	3

1 Сопряженный оператор

Здесь и далее, если не оговорено иного, считаем, что мы находимся в В-пространствах.

Определение (Сопряженное пространство). $X^* = \left\{ f : X \xrightarrow[\text{непр.}]{\text{линь.}} \mathbb{R} \right\}$ - пространство сопряженное к X .

Заметим, что это пространство линейных функционалов, а значит, мы можем ввести в нем норму, как норму линейного функционала.

$$\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| \quad (1)$$

По свойствам числовой оси, получаем, что X^* - всегда банахово (независимо от X).

Рассмотрим теперь $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. Пусть $f(x) = \varphi(Ax)$, где $\varphi \in Y^*$.

Определение. Сопряженный оператор к A имеет вид: $A^*(\varphi) = \varphi \circ A$.

Утверждение 1.1. Если A - непрерывный, то A^* - тоже непрерывный.

Доказательство. Пусть A - непрерывен, тогда он ограничен. Тогда мы можем написать

$$\|A^*(\varphi)\| \leq \|\varphi\| \cdot \|A\| \quad (2)$$

Переходя к \sup по φ , получаем, что нужно. \square

Теорема 1.2. $\|A^*\| = \|A\|$

Доказательство. Мы доказали неравенство в одну сторону (неравенство 2). Докажем в другую. По определению \sup , $\forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon : \|x_\varepsilon\| = 1 \Rightarrow \|A\| - \varepsilon < \|Ax_\varepsilon\|$. Пусть $Z = \mathcal{L}(Ax_\varepsilon)$. Рассмотрим $f : Z \rightarrow \mathbb{R}, f(z) = \alpha \|Ax_\varepsilon\|$. Очевидно, что $f \in Y^*$. Поэтому, по теореме Хана-Банаха, распространим f на все Y , и назовем ее φ_ε . Тогда, по свойствам f , $\|\varphi_\varepsilon\| = 1, \varphi_\varepsilon(Ax_\varepsilon) = \|Ax_\varepsilon\|$. Следовательно, $\|A\| - \varepsilon < \varphi_\varepsilon(Ax_\varepsilon) = A^*(\varphi_\varepsilon, x_\varepsilon)$. Тогда, $\|A\| - \varepsilon < \|A^*\| \cdot \|\varphi_\varepsilon\| \cdot \|x_\varepsilon\| = \|A^*\|$. Переходя к \sup по ε получаем нужное неравенство. \square

Пример: **TODO**

Теорема 1.3 (Теорема Рисса). Пусть H - гильбертово пространство. Тогда $\forall f \in H^*, f$ можно представить как $f(x) = \langle x, y \rangle$, где $y \in H, \|f\| = \|y\|$.

Доказательство. Докажем в 3 этапа:

1. Построим соответствующий функционал по данному y .
 2. Докажем, что этому функционалу соответствует только один y .
 3. Найдем y для данного функционала f .
1. Пусть $g(x) = \langle x, y \rangle$. Очевидно, что это линейный функционал. По неравенству Шварца $|g(x)| \leq \|y\| \|x\| \Rightarrow \|g\| \leq \|y\|$. Это значит, что g - ограничен. Возьмем $x = \frac{y}{\|y\|}$.

$$g\left(\frac{y}{\|y\|}\right) = \left\langle \frac{y}{\|y\|}, y \right\rangle = \frac{1}{\|y\|} \langle y, y \rangle = \|y\|$$

Сопоставляя это с тем, что $\|g\| \leq \|y\|$, получаем, что $\|g\| = \|y\|$.

2. Пусть для какого-то $\tilde{y}, g(x) = \langle x, \tilde{y} \rangle$. Тогда $0 = \langle x, y \rangle - \langle x, \tilde{y} \rangle = \langle x, y - \tilde{y} \rangle$. Пусть $x = y - \tilde{y}, \Rightarrow \langle y - \tilde{y}, y - \tilde{y} \rangle = 0 \Rightarrow y = \tilde{y}$
3. Рассмотрим произвольный функционал $f \in H^*$. Как известно, $\text{Ker } f$ - гиперплоскость, т.е. $\text{codim } H_1 = \dim H_2 = 1$, где $H_1 = \text{Ker } f, H_2 = H_1^\perp$, и $H = H_1 \oplus H_2$. Это по определению значит, что x единственным образом представим как $x = x_1 + x_2$, где $x_1 \in H_1, x_2 \in H_2$. Поэтому, $f(x) = f(x_1) + f(x_2) = f(x_2) = f(\alpha e) = \alpha \cdot f(e)$, так как $x_1 \in \text{Ker } f$ а e - базисный вектор из H_2 . Итак, $\alpha \cdot f(x) = \langle x, y \rangle \Leftrightarrow f(e) = \langle e, y \rangle$. Очевидно, y можно брать из H_2 , так как если у него будет компонента из $\text{Ker } f$, то она будет ортогональна e . Поэтому, считаем, что $y = \beta e$. Получаем $f(e) = \langle e, \beta e \rangle = \beta \cdot \|e\|^2$. Положим $\beta = \frac{f(e)}{\|e\|^2}$, тогда $y = \frac{f(e)}{\|e\|^2} e$.

\square

Пример: **TODO**

2 Ортогональное дополнение в банаховых пространствах

Определение (Ортогональное дополнение в B -пространстве). Пусть $S \subset X$.

Тогда $S^\perp = \{f \mid f \in X^*, \forall x \in S \Rightarrow f(x) = 0\}$.

Определение (Ортогональное дополнение в сопряженном пространстве). Пусть $S \subset X^*$.

Тогда $S^\perp = \{x \mid x \in X, \forall f \in S \Rightarrow f(x) = 0\}$.

Заметим, что независимо от S , S^\perp - замкнуто, в силу непрерывности $f(x)$

Утверждение 2.1. 1. $X^\perp = \{0\}$

2. $X^{*\perp} = \{0\}$

Доказательство. 1. $f \in X^\perp$, Если $\forall x \in X, f(x) = 0$, то $f \equiv 0$

2. Рассмотрим $\forall f \in X^*$, очевидно, $f(0) = 0$, а это значит, что $0 \in X^{*\perp}$. Предположим, $\exists x_0 \neq 0 : x_0 \in X^{*\perp}$. По теореме Хана-Банаха (а точнее, по следствию, которое мы доказали в теореме 1.2), $\exists f \in X^*$, такой, что $f(x_0) = \|x_0\| \neq 0$, следовательно, $x_0 \notin X^{*\perp}$. □

Определение. $R(A) \stackrel{\text{def}}{=} \{Ax \mid x \in X\}$

Теорема 2.2. $\text{Cl } R(A) = (\text{Ker } A^*)^\perp$

Доказательство. **TODO** □

Теорема 2.3. $R(A) = \text{Cl } R(A) \Rightarrow \text{Cl } R(A^*) = (\text{Ker } A)^\perp$

Доказательство. **TODO** □