Steel Supplier Analysis

Регрессионный анализ

Загружаем данные в объект Data. Frame и добавляем количество несломанных мечей для каждой партии, а также процент сломавшихся в последний месяц мечей к количеству несломанных.

```
steel <- read.csv("production-data.csv")
steel <- steel %>%
  group_by(unsullen.id, production.date) %>%
  mutate(
    unbroken = lag(cumsum(produced) - cumsum(defects)),
    broke_perc = defects / unbroken
)
```

Найдем средние значения процента сломавшихся мечей по кузнецам.

```
steel.sum <- steel %>%
  group_by(supplier, production.date, report.date) %>%
  filter(production.date != report.date) %>%
  summarize(
   mean = mean(broke_perc)
)
```

Найдем среднее геометрическое значения процента сломавшихся мечей по времени использования меча, а также для каждой партии найдем отклонение от этого среднего.

```
steel.sum <- steel.sum %>%
  group_by(supplier, report.date - production.date) %>%
  mutate(
    memean = exp(mean(log(mean))),
    deviation = mean/memean
)
```

Выведем наглядную зависимость процента сломавшихся мечей от месяца репорта и месяца производства.


```
steel.time <- steel.sum %>%
  ungroup() %>%
  select(supplier, report.date, production.date, deviation) %>%
  spread(report.date, deviation)
print(steel.time)
```

```
## # A tibble: 12 <U+00D7> 8
                                                             `4`
                                          `2`
                                                    `3`
                                                                        `5`
##
          supplier production.date
## *
            <fctr>
                            <int>
                                        <dbl>
                                                  dbl>
                                                           <dbl>
                                                                      <dbl>
## 1
                                 1 0.9696078 1.0046407 1.019789 1.0221937
          harpy.co
## 2
         harpy.co
                                 2
                                          NA 1.0200700 1.032068 1.0619275
## 3
          harpy.co
                                 3
                                           NA
                                                     NA 1.009517 1.0084505
## 4
          harpy.co
                                 4
                                           NA
                                                     NA
                                                              NA 1.0028517
                                 5
## 5
                                           NA
                                                     NA
                                                              NA
          harpy.co
                                                                        NA
## 6
                                 6
                                           NA
                                                     NA
          harpy.co
                                                              NΑ
                                 1 1.0019465 0.9831676 1.070277 0.9394950
## 7
      westeros.inc
                                 2
                                           NA 0.9967793 1.031749 0.9554881
## 8
     westeros.inc
## 9 westeros.inc
                                 3
                                           NA
                                                     NA 1.028123 1.0407349
                                 4
                                           NA
## 10 westeros.inc
                                                     NΑ
                                                              NA 1.0056238
```

Все значения близки к единице. Получили, что процент сломавшихся мечей не зависит от месяца ведения войны и не зависит от месяца поступления стали. В такой случае достаточно наблюдать зависимость процента сломанных мечей от времени их использования отдельно по каждому производителю.

```
steel.sword.life <- steel %>%
  group_by(supplier, report.date - production.date) %>%
  filter(report.date - production.date != 0) %>%
  summarize(
    defects.sum = sum(defects),
    swords.sum = sum(unbroken),
    risk = defects.sum/swords.sum
)

ggplot(steel.sword.life, aes(x = `report.date - production.date`, y = risk)) +
    geom_point(aes(colour = supplier))
```



По полученному графику можно сделать предположение о том, что в Westeros.Inc вероятность поломки меча постоянная во времени, а в Нагру.Со первые три месяца низкая, а потом резко возрастает и остается постоянной. Вычислим эти вероятности, а также среднюю производительность кузнецов.

```
risk.west <- mean(
  (steel.sword.life %>%
   filter(supplier == "westeros.inc")
)$risk
```


```
risk.harp.1 <- mean(
  (steel.sword.life %>%
    filter(supplier == "harpy.co") %>%
    slice(1:3)
   )$risk
)

risk.harp.2 <- mean(
  (steel.sword.life %>%
    filter(supplier == "harpy.co") %>%
    slice(4:6)
  )$risk
)

swords.mean <- mean(
  (steel %>%
    filter(produced != 0)
  )$produced
)
```

Построение предсказания

В рамках принятой модели найдем количество несломанных мечей в каждый месяц при выборе одного из поставщиков.



По графику нельзя однозначно оценить правильность выбора конкретного поставщика. Для численного сравнения поставщиков введем численную характеристику их пользы. Выразим это как время работы всех мечей в течение горизонта планирования.

Для этого достаточно найти матожидание исправности меча для каждого из поставщиков. Выберем для этого распределение Бернулли с модификациями. Первая модификация – изменение вероятности поломки меча из стали Harpy.Co спустя 3 месяца эксплуатации. Вторая – мы условимся, что в конце горизонта планирования все мечи ломаются, так как их полезность становится равной нулю.

```
expect.west <- function(n) {</pre>
  prob.west <- rep(risk.west, n)</pre>
  prob.west \leftarrow c(\text{prob.west*}(1-\text{risk.west})^(0:(n-1)), (1-\text{risk.west})^(n))
  mean.west <- sum(prob.west*(1:(n+1)))</pre>
  return(mean.west)
}
expect.west.all = mean(sapply((1:9), expect.west))
expect.harp <- function(n) {</pre>
  prob.harp <- c(risk.harp.1, risk.harp.1*(1-risk.harp.1),</pre>
                   risk.harp.1*(1-risk.harp.1)^2)
  temp <- rep(risk.harp.2*(1-risk.harp.1)^3, 6)</pre>
  prob.harp <- c(prob.harp, temp*(1-risk.harp.2)^(0:5))</pre>
  prob.harp <- head(prob.harp, n)</pre>
  if(n == 1) {
    prob.harp <- c(prob.harp, 1-risk.harp.1)</pre>
  } else if(n == 2) {
```

```
prob.harp <- c(prob.harp, (1-risk.harp.1)^2)
} else {
    prob.harp <- c(prob.harp, (1-risk.harp.1)^3*(1-risk.harp.2)^(n-3))
}
mean.harp <- sum(prob.harp*(1:(n+1)))
    return(mean.harp)
}
expect.harp.all = mean(sapply((1:9), expect.harp))

print(expect.harp.all)

## [1] 4.949132
print(expect.west.all)</pre>
```

[1] 4.660751

Мы получили, что мечи из стали Harpy. Со долговечнее на \sim 0.3 месяца, а значит, именно эту компанию нужно выбрать в качестве эксклюзивного поставщика.