

PHARM-ASSIST

Relatório de Triagem Farmacêutica

Dados do Paciente

Nome:	arthur oliveira
Idade:	18 anos
Sexo:	Masculino
Peso:	80.0 kg
Altura:	1.9 m

Dados da Consulta

Data/Hora:	29/10/2025 às 21:20
ID da Consulta:	47

Anamnese - Perguntas e Respostas

1. espirro_congestao_nasal_1

Resposta: nao

2. espirro_congestao_nasal_2

Resposta: nao

3. espirro_congestao_nasal_3

Resposta: 4

4. espirro_congestao_nasal_4

Resposta: sim

5. espirro_congestao_nasal_5

Resposta: sim

6. espirro_congestao_nasal_6

Resposta: sim

7. espirro_congestao_nasal_7

Resposta: nao

8. espirro_congestao_nasal_8

Resposta: nao

9. espirro_congestao_nasal_9

Resposta: nao

10. espirro_congestao_nasal_10

Resposta: nao

11. espirro_congestao_nasal_11

Resposta: sim

12. espirro_congestao_nasal_12

Resposta: sim

13. espirro_congestao_nasal_13

Resposta: sim

14. espirro_congestao_nasal_14

Resposta: nao

Resultado da Triagem

Pontuação Total:	7.0
Nível de Risco:	BAIXO
Confiança:	100.0%
Encaminhamento:	NÃO

Recomendações Farmacológicas

#	Medicamento	Justificativa
1	Sorine (Cloridrato de Naftazolina) - Congestão nasal Posologia: 2喷鼻孔喷鼻孔 a cada 12 horas Não usar por mais de 3 dias	Baseada na justificativa
2	Allegra (Fexofenadina) - Congestão nasal alérgica Posologia: 1 comprimido ao dia Pode causar sonolência	Baseado na pontuação: 7.0
3	Claritin (Loratadina) - Antihistamínico para alergia Posologia: 1 comprimido ao dia Não causa sonolência	Baseado na pontuação: 7.0
4	Rinosoro (Soro Fisiológico) - Lavagem nasal Posologia: Basilar lavagem nasal ao dia Higiene nasal	Baseado na pontuação: 7.0
5	Nasonex (Mometasona) - Spray nasal anti-inflamatório Posologia: 1喷鼻孔喷鼻孔 a cada 12 horas Só com prescrição médica	Baseada na justificativa
6	Benadryl (Difenidramina) - Antihistamínico sedativo Posologia: 1 comprimido a cada 6 horas Causa sonolência	Baseado na pontuação: 7.0

Recomendações Não Farmacológicas

1. Lavagem nasal com soro fisiológico

Recomendação não farmacológica baseada na pontuação

2. Umidificar o ambiente

Recomendação não farmacológica baseada na pontuação

3. Evitar alérgenos conhecidos

Recomendação não farmacológica baseada na pontuação

4. Usar máscara em ambientes poluídos

Recomendação não farmacológica baseada na pontuação

5. Manter ambiente limpo e arejado

Recomendação não farmacológica baseada na pontuação

Observações

- MODULO: espirro_congestao_nasal
- Pontuação total: 7.0

- Nível de risco: baixo
- Confiança: 100.0%
- Categoria principal: sintoma

Relatório gerado em 29/10/2025 às 21:23:50

Pharm-Assist - Sistema de Triagem Farmacêutica