

Topología general

Pablo Pallàs

4 de junio de 2023

Índice

1. Espacios topológicos	1
1.1. Espacios topológicos	1
2. Aplicaciones continuas y homeomorfismos	10
3. Separación y numerabilidad	10
4. Espacios métricos	10
5. Compacidad	10
6. Conexión	10

1. Espacios topológicos

1.1. Espacios topológicos

Sea X un conjunto y $\mathcal{P}(X) = \{A : A \subset X\}$ el conjunto de sus partes, entonces:

Definición 1.1. Una **topología** sobre un conjunto X es un subconjunto $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$ que satisface:

- I. El conjunto vacío \emptyset y el conjunto total X pertenecen a τ .
- II. La unión arbitraria de elementos de τ también pertenece a τ .
- III. La intersección finita de elementos de τ también pertenece a τ .

El par (X, τ) lo denominaremos **espacio topológico** y a los elementos de τ los llamaremos **abiertos**.

Es decir, podríamos decir que una topología es una colección de subconjuntos que contiene al vacío y al total, y que es cerrada para las uniones arbitrarias y las intersecciones finitas.

Ejemplo 1.1.1. Sea X un conjunto arbitrario y $\tau_D = \mathcal{P}(X)$. Entonces, τ_D es una topología en X ya que contiene a todos los subconjuntos de X , en particular al vacío y al total, es cerrada para las uniones arbitrarias y para las intersecciones finitas. A esta topología la denominaremos **topología discreta**, y al conjunto X dotada de esta topología **espacio discreto**.

Ejemplo 1.1.2. Sea X un conjunto arbitrario y $\tau_I = \{\emptyset, X\}$. Entonces la colección τ_I es una topología sobre X : contiene al vacío y al total, la unión de ambos es $X \in \tau_I$ y la intersección es $\emptyset \in \tau_I$. Esta topología la denominaremos **topología indiscreta**, y es la topología más simple que puede tener un conjunto. A un conjunto X dotado con esta topología lo denominaremos **espacio indiscreto**.

Definición 1.2. Dos topologías τ_1, τ_2 sobre un conjunto X se dicen **comparables** si $\tau_1 \subset \tau_2$ ó $\tau_2 \subset \tau_1$. Si $\tau_1 \subset \tau_2$ diremos que τ_2 es más **fina** (tiene más abiertos) que τ_1 .

Intuitivamente podríamos decir que una topología τ' es más fina que otra τ si tiene todos los abiertos de τ y algunos más. Una topología más fina distingue de forma "más fina" los puntos y sus alrededores. Evidentemente, sobre un conjunto X cualquiera la topología más fina que podemos encontrar es la topología discreta τ_D . Por otra parte, la topología indiscreta τ_I es la menos fina que podemos encontrar. Luego cualquier otra topología τ se encontrará entre estas dos: $\tau_I \subseteq \tau \subseteq \tau_D$.

Notar que si τ_1 y τ_2 son dos topologías sobre X es fácil ver que $\tau_1 \cap \tau_2$ es una topología sobre X . En general, la unión $\tau_1 \cup \tau_2$ no es necesariamente una topología.

Ejemplo 1.2.1. Consideremos el siguiente conjunto:

$$\tau_u = \{U \subset \mathbb{R} : \forall x \in U \exists \epsilon > 0 \text{ t.q. } (x - \epsilon, x + \epsilon) \subset U\}.$$

Entonces:

1. $\emptyset \in \tau_u$ trivialmente y $\mathbb{R} \in \tau_u$ ya que si tenemos un $x \in \mathbb{R}$ y $\epsilon = 1$, entonces $(x - 1, x + 1) \in \mathbb{R}$.
2. Dada $\{U_i\}_{i \in J}$ una colección arbitraria de elementos de τ_u entonces, si consideramos un $x \in \cup_i U_i$ existirá un $i_0 \in J$ tal que $x \in U_{i_0}$. Como $U_{i_0} \in \tau_u$ existirá un $\epsilon > 0$ tal que $(x - \epsilon, x + \epsilon) \subset U_{i_0} \subset \cup_i U_i$ y así $\cup_i U_i \in \tau_u$.
3. Sean $U, V \in \tau_u$, $x \in U \cap V$. Como $U \in \tau_u$ existirá un $\epsilon_1 > 0$ tal que $(x - \epsilon_1, x + \epsilon_1) \subset U$. Como $V \in \tau_u$ existirá un $\epsilon_2 > 0$ tal que $(x - \epsilon_2, x + \epsilon_2) \subset V$. Ahora, si escogemos $\epsilon = \min\{\epsilon_1, \epsilon_2\}$ entonces tendremos:

$$(x - \epsilon, x + \epsilon) \subset U \subset U \cap V$$

$$(x - \epsilon, x + \epsilon) \subset V \subset U \cap V$$

y así $U \cap V \in \tau_u$.

Luego τ_u es una topología, que denominaremos **topología usual**. Al espacio topológico (\mathbb{R}, τ_u) lo denominaremos **recta real**.

■

Definición 1.3. Sea (X, τ) un espacio topológico, un conjunto $\mathfrak{B} \subset \tau$ de abiertos se dice **base** de τ si todo elemento de τ es unión de elementos de \mathfrak{B} . A estos elementos de \mathfrak{B} los denominaremos **abiertos básicos**.

Ejemplo 1.3.1. Veamos algunos ejemplos:

1. La propia topología τ es base de sí misma.
2. Es claro que $\mathfrak{B} = \{\{x\} : x \in X\}$ es base de la topología discreta τ_D sobre X .
3. El conjunto de intervalos $\mathfrak{B}_U = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$ es una base para la topología usual sobre \mathbb{R} , τ_U .

Proposición 1.4. Sea (X, τ) un espacio topológico, entonces $\mathfrak{B} \subset \tau$ es una base si y sólo si para todo $U \in \tau$ y todo $x \in U$ existe $B \in \mathfrak{B}$ tal que $x \in B \subset U$.

Demostración: Sea $x \in U$, si $\mathfrak{B} = \{B_i : B_i \in \tau\}$ es una base entonces $U = \bigcup B_i$, por lo que existirá $B_k \in \mathfrak{B}$ tal que $x \in B_k \subset U$. Recíprocamente, dado $U \in \tau$, si para todo $x \in U$ existe $B_i \in \mathfrak{B}$ tal que $x \in B_i \subset U$ entonces es claro que $U = \bigcup B_i$.

□

Proposición 1.5. Sea (X, τ) un espacio topológico y $\mathfrak{B} \subset \tau$ una base, entonces $U \subset X$ es un abierto si y sólo si para todo $x \in U$ existe un $B \in \mathfrak{B}$ tal que $x \in B \subset U$.

Luego:

Corolario 1.5.1. Sea (X, τ) un espacio topológico y $A \subset X$, entonces A es abierto si y sólo si para todo $x \in A$ existe un abierto $U \in \tau$ tal que $x \in U \subset A$.

Sin embargo, no toda familia de partes de un conjunto es una base para una topología. Para identificar a estos conjuntos especiales tenemos el siguiente resultado:

Proposición 1.6. Sea $\mathfrak{B} \subset \mathcal{P}(X)$ satisfaciendo:

1. Para todo $x \in X$ existe un $B \in \mathfrak{B}$ tal que $x \in B$.
2. Dados $B_1, B_2 \in \mathfrak{B}$ y $x \in B_1 \cap B_2$, entonces existe un $B \in \mathfrak{B}$ tal que $x \in B \subset B_1 \cap B_2$.

Entonces, el conjunto $\tau_{\mathfrak{B}} \subset \mathcal{P}(X)$ definido por $U \in \tau_{\mathfrak{B}}$ si y sólo si para todo $x \in U$ existe $B \in \mathfrak{B}$ tal que $x \in B \subset U$ es una topología sobre X que tiene a \mathfrak{B} como base. Llamaremos a $\tau_{\mathfrak{B}}$ topología generada por \mathfrak{B} .

Demostración. Trivialmente se tiene que $\emptyset \in \tau_{\mathfrak{B}}$ y también está claro que $X \in \tau_{\mathfrak{B}}$.

Sea ahora $\{U_i\}_{i \in J} \subset \tau_{\mathfrak{B}}$ y $U = \bigcup_i U_i$, dado un $x \in U$ entonces $x \in U_k$ para algún $k \in J$ y existirá $B \in \mathfrak{B}$ tal que $x \in B \subset U_k \subset U$, por lo que $U \in \tau_{\mathfrak{B}}$.

Sean ahora U_1 y $U_2 \in \tau_{\mathfrak{B}}$ y veamos que $U_1 \cap U_2 \in \tau_{\mathfrak{B}}$, en efecto, dado $x \in U_1 \cap U_2$ existirán $B_1, B_2 \in \mathfrak{B}$ tales que $x \in B_1 \subset U_1$ y $x \in B_2 \subset U_2$, entonces $x \in B_1 \cap B_2$ y así existirá un $B \in \mathfrak{B}$ tal que $x \in B \subset B_1 \cap B_2 \subset U_1 \cap U_2$, por lo que $U_1 \cap U_2 \in \tau_{\mathfrak{B}}$.

Por inducción finita se sigue para cualquier subfamilia finita $\{U_1, \dots, U_n\} \subset \tau_{\mathfrak{B}}$. Se concluye así que $\tau_{\mathfrak{B}}$ es una topología sobre X con base \mathfrak{B} . □

Ejemplo 1.6.1. Consideremos el producto cartesiano \mathbb{R}^n de n copias del conjunto de los números reales. En \mathbb{R}^n consideramos la **distancia euclídea**

$$\begin{aligned} d: \quad \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ ((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) &\longmapsto \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2} \end{aligned}$$

Entonces, dado $x \in \mathbb{R}^n$ y $r \in \mathbb{R}$ con $r > 0$, podemos definir la **bola abierta** de centro x y radio r como el subconjunto

$$B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : d(x, y) < r\}.$$

La colección de bolas en \mathbb{R}^n

$$\mathfrak{B} = \{B(x, r) : x \in \mathbb{R}^n, r > 0\}$$

forman una base para la topología usual en \mathbb{R}^n . A \mathbb{R}^n dotado de esta topología se denomina **espacio euclídeo n -dimensional**. Concretamente, la recta real (\mathbb{R}, τ_u) es el espacio euclídeo 1-dimensional.

Notar:

1. $\mathbb{R}^n = \cup_x B(x, 1)$.
2. Sean $B_1, B_2 \in \mathfrak{B}$ tales que $B_1 \cap B_2 \neq \emptyset$. Supongamos que $B_1 = B(x_1, r_1)$ y $B_2 = B(x_2, r_2)$ y sea $x \in B_1 \cap B_2$. Tenemos que ver que existe un $r > 0$ tal que $B(x, r) \subset B_1 \cap B_2$. Para ello basta escoger $0 < r < \min\{r_1 - d(x, x_1), r_2 - d(x, x_2)\}$. Así, si $y \in B(x, r)$ entonces $d(y, x_i) \leq d(y, x) + d(x, x_i) < r + d(x, x_i) < r_i$, con $i = 1, 2$.

Realmente, como ya sabemos, no necesitamos definir una distancia para encontrar una base para un espacio topológico ni tampoco para definirlo. Esto se utilizará más adelante para hablar de otro tipo de espacios. ■

Proposición 1.7. Sean \mathfrak{B}_1 y \mathfrak{B}_2 bases de sendas topologías τ_1 y τ_2 sobre un conjunto X , entonces τ_2 es más fina que τ_1 , es decir, $\tau_1 \subset \tau_2$ si y sólo si para todo $x \in X$ y todo $B_1 \in \mathfrak{B}_1$ tal que $x \in B_1$ existe $B_2 \in \mathfrak{B}_2$ tal que $x \in B_2 \subset B_1$.

Demostración. Supongamos que $\tau_1 \subset \tau_2$, dado $x \in X$ y $B_1 \in \mathfrak{B}_1$ tal que $x \in B_1$, en particular $B_1 \in \tau_1$ y por tanto $B_1 \in \tau_2$, entonces existe $B_2 \in \mathfrak{B}_2$ tal que $x \in B_2 \subset B_1$.

Recíprocamente, si $U \in \tau_1$ existirá $B_1 \in \mathfrak{B}_1$ tal que $x \in B_1 \subset U$ y como existe $B_2 \in \mathfrak{B}_2$ tal que $x \in B_2 \subset B_1$ se tiene entonces que $x \in B_2 \subset U$ y por tanto se sigue que $U \in \tau_2$. □

Ejemplo 1.7.1. La familia \mathfrak{B}_S de los intervalos semiabiertos de la forma $[a, b)$ satisfacen las condiciones de 1.6, luego forman base de una topología τ_S sobre \mathbb{R} . Al espacio topológico (\mathbb{R}, τ_S) ó simplemente \mathbb{R}_S se le conoce como **recta de Sorgenfrey**.

Notar que para todo $x \in \mathbb{R}$ y todo intervalo (a, b) tal que $x \in (a, b)$ está claro que $x \in [x, b) \subset (a, b)$, por lo que $\tau_U \subset \tau_S$, y como $[a, b) \notin \tau_U$ se sigue que la topología de Sorgenfrey es estrictamente más fina que la usual.

■

Definición 1.8. Dado un espacio topológico (X, τ) y un punto $x \in X$, llamaremos **entorno** de x a todo subconjunto $N \subset X$ que contiene a x como punto interior, es decir, a todo N para el cual existe $U \in \tau$ tal que $x \in U \subset N$.

Aunque, en general, los entornos no son necesariamente abiertos, nosotros solamente consideraremos entornos abiertos. Así, por entorno de un punto entenderemos todo abierto que lo contiene.

Definición 1.9. Dado un espacio topológico (X, τ) , denotaremos por $\varepsilon(x) = \{U \in \tau : x \in U\}$ a la familia de todos los entornos abiertos de x y diremos que $\mathfrak{B}_x \subset \varepsilon(x)$ es una **base de entornos de x** ó **base local respecto de x** si para todo $U \in \tau$ tal que $x \in U$ existe un $B \in \mathfrak{B}_x$ tal que $x \in B \subset U$.

Además, está claro que $\mathfrak{B} = \cup_x \mathfrak{B}_x$ es una base para τ . Recíprocamente, si \mathfrak{B} es una base para τ , entonces $\mathfrak{B}_x = \mathfrak{B} \cap \varepsilon(x)$ es una base local respecto de x .

No toda familia de partes de un conjunto X es una topología, ni forman base para una topología. Sin embargo, todo subconjunto $\mathcal{S} = \{S_{ij}\} \subset \mathcal{P}(X)$ tal que $X = \cup S_{ij}$ determina una topología sobre X : si denotamos por $\mathfrak{B}_\mathcal{S} = \{B_i\}$ el conjunto de las intersecciones finitas de elementos de \mathcal{S} , es decir, $B_i = S_{1i} \cap \dots \cap S_{ni}$ para algún n , entonces el conjunto $\tau_\mathcal{S}$ de las uniones arbitrarias de elementos de $\mathfrak{B}_\mathcal{S}$ es una topología sobre X que tiene a $\mathfrak{B}_\mathcal{S}$ como base. Notaremos que $\tau_\mathcal{S}$ es la menor topología sobre X tal que $\mathcal{S} \subset \tau_\mathcal{S}$. El conjunto \mathcal{S} se dirá **subbase** de $\tau_\mathcal{S}$.

Definición 1.10. Sea (X, τ) un espacio topológico y $A \subset X$ un subconjunto de X . Un punto $x \in A$ se dice **punto interior** de A si existe un abierto $U \in \tau$ tal que $x \in U \subset A$. Denotaremos por $\text{Int}A$ el conjunto de todos los puntos interiores de A . Claramente $\text{Int}A \subset A$ y A es abierto si y sólo si $A = \text{Int}A$.

Proposición 1.11. Sea (X, τ) un espacio topológico y $A \subset X$. El conjunto $\text{Int}A$ de todos los puntos interiores de A es la unión de todos los abiertos contenidos en A . En particular, $\text{Int}A$ es el mayor abierto contenido en A .

Demostración. Sea $\mathcal{U} = \{U \in \tau : U \subset A\}$ la familia de todos los abiertos contenidos en A , todo punto de U es interior y por tanto $U \subset \text{Int}A$ para todo $U \in \mathcal{U}$, por lo que se sigue que $\cup_{U \in \mathcal{U}} U \subset \text{Int}A$. Por otro lado, para todo $x \in \text{Int}A$ existe un abierto $U_x \in \tau$ tal que $x \in U_x \subset A$, por lo que $\text{Int}A = \cup_{x \in \text{Int}A} \{x\} \subset \cup_{x \in \text{Int}A} U_x \subset \cup_{U \in \mathcal{U}} U$, ya que $U_x \in \mathcal{U}$ y así concluimos que $\text{Int}A = \cup_{U \in \mathcal{U}} U$.

□

Proposición 1.12. Sea (X, τ) un espacio topológico y $A \subset X$, entonces se satisface:

1. $\text{Int}(\text{Int}A) = \text{Int}A$.
2. Si $B \subset A$ entonces $\text{Int}B \subset \text{Int}A$.
3. $\text{Int}(A \cap B) = \text{Int}A \cap \text{Int}B \quad \forall A, B \in X$.
4. $\text{Int}A \cup \text{Int}B \subset \text{Int}(A \cup B) \quad \forall A, B \in X$.

Demostración. Son todas inmediatas. Observar que en el último caso el contenido es estricto, por ejemplo: en \mathbb{R} con la topología usual tomamos $A = [0, 1]$ y $B = [1, 2]$, entonces $A \cup B = [0, 2]$ y tenemos $\text{Int}(A \cup B) = (0, 2)$, sin embargo $\text{Int}A \cup \text{Int}B = (0, 1) \cup (0, 2) = (0, 2) \setminus \{1\}$.

□

Definición 1.13. Sea (X, τ) un espacio topológico, un subconjunto $F \subset X$ se dirá **cerrado** si su complementario, $X \setminus F$, es abierto.

Aplicando las leyes de De Morgan obtenemos el siguiente resultado:

Proposición 1.14. Sea (X, τ) un espacio topológico, la familia de los cerrados satisface:

1. X y \emptyset son cerrados.
2. La intersección arbitraria de cerrados es un cerrado.
3. La unión finita de cerrados es un cerrado.

Y es que en un espacio topológico, abiertos y cerrados se determinan mutuamente. Dada una familia $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$ de subconjuntos de X satisfaciendo las propiedades anteriores, entonces es claro que $\tau = \{X \setminus F : F \in \mathcal{F}\}$ es una topología sobre X tal que \mathcal{F} es la familia de sus cerrados.

Definición 1.15. Sea (X, τ) un espacio topológico y $A \subset X$, un punto $x \in X$ se dice **punto de acumulación de A** si para todo abierto U tal que $x \in U$ se tiene que $(U \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$. Llamaremos **derivado de A** y lo denotaremos por A' al conjunto de todos los puntos de acumulación de A .

Además, dados $A, B \subset X$, entonces $(A \cup B)' = A' \cup B'$. En particular, si $A \subset B$ entonces $A' \subset B'$.

Los cerrados son aquellos que contienen a su derivado:

Proposición 1.16. Sea (X, τ) un espacio topológico y $F \subset X$, entonces F es cerrado si y sólo si $F' \subset F$.

Demostración. Sea F cerrado y $x \in F'$, si $x \notin F$ entonces $x \in X \setminus F$ abierto y así existirá un abierto $U \in \tau$ tal que $x \in U \subset X \setminus F$, en particular $(U \setminus \{x\}) \cap F = \emptyset$, lo cual contradice que $x \in F'$.

Recíprocamente, si $F' \subset F$ y $x \in X \setminus F$ entonces $x \notin F'$ y existirá un U abierto tal que $(U \setminus \{x\}) \cap F = \emptyset$ ó bien $U \cap F = \emptyset$, ya que $x \notin F$. Así, $x \in U \subset X \setminus F$, es decir, $X \setminus F$ es abierto y F es cerrado.

□

Definición 1.17. Sea (X, τ) un espacio topológico y $A \subset X$, definimos la **clausura** o cierre de A en X , y lo denotamos por $Cl_X A$ o \overline{A} a la unión de A con su derivado, es decir, $\overline{A} = A \cup A'$.

Además, está claro que $A \subset \overline{A}$ para todo $A \subset X$ y es claro que A es cerrado si y sólo si $A = \overline{A}$.

Los puntos de la clausura, denominados **puntos adherentes** o de adherencia, se pueden caracterizar así:

Proposición 1.18. Sea (X, τ) un espacio topológico y $A \subset X$, entonces $x \in \overline{A}$ si y sólo si $U \cap A \neq \emptyset$ para todo $U \in \tau$ tal que $x \in U$.

Proposición 1.19. Sea (X, τ) un espacio topológico y $A, B \subset X$, entonces se satisface:

1. $X \setminus \overline{A} = \text{Int}(X \setminus A)$.
2. $\overline{X \setminus A} = X \setminus \text{Int} A$.
3. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$, en particular $A \subset B \Rightarrow \overline{A} \subset \overline{B}$.
4. $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$.

Demostración. Notar que $x \notin \overline{A}$ si y sólo si existe $U \in \tau$ tal que $x \in U \subset X \setminus A$, por lo que $X \setminus \overline{A} = \text{Int}(X \setminus A)$. Claramente 2 se sigue de 1 cambiando A por $X \setminus A$. Por 1, $\overline{A \cup B} = X \setminus \text{Int}[X \setminus (A \cup B)] = X \setminus \text{Int}[(X \setminus A) \cap (X \setminus B)] = X \setminus [\text{Int}(X \setminus A) \cap \text{Int}(X \setminus B)] = [X \setminus \text{Int}(X \setminus A)] \cup [X \setminus \text{Int}(X \setminus B)] = \overline{A} \cup \overline{B}$. Si $A \subset B$ entonces $B = A \cup B$ y así $\overline{B} = \overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$, y en consecuencia $\overline{A} \subset \overline{B}$. De esto último deducimos fácilmente que $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$.

□

A lo largo de la demostración anterior se utiliza una expresión que se obtiene de reformular el primer punto. Y es que podemos deducir claramente que $\overline{A} = X \setminus \text{Int}(X \setminus A)$.

Además, el contenido del último punto es, en general, estricto. En efecto, sea \mathbb{R} con la topología usual, $A = \mathbb{Q}$ y $B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, entonces para todo $x \in \mathbb{R}$ es claro que $(x - r, x + r) \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset$ para todo $r > 0$, por lo que $x \in \overline{\mathbb{Q}}$, es decir, $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$. Análogamente, $\overline{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}} = \mathbb{R}$, por lo que $\overline{A} \cap \overline{B} = \mathbb{R}$ mientras que $\overline{A \cap B} = \overline{\emptyset} = \emptyset$.

Proposición 1.20. La clausura de A es la intersección de todos los cerrados que contienen a A . En particular, \overline{A} es el menor cerrado que contiene a A .

Demostración. Sea $\mathcal{F} = \{F_i : F_i = \overline{F_i}, A \subset F_i\}$ la familia de los cerrados que contienen a A , notar que $\overline{A} \in \mathcal{F}$, luego es claro que $\cap F_i \subset \overline{A}$. Por otra parte, $A \subset F_i$ implica $\overline{A} \subset \overline{F_i} = F_i$ para todo $F_i \in \mathcal{F}$ y así $\overline{A} \subset \cap F_i$.

□

Definición 1.21. Sea (X, τ) un espacio topológico. Definimos la **frontera** de $A \subset X$, como $FrA = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}$. En particular, FrA es un cerrado para todo $A \subset X$ y es claro que $FrA = Fr(X \setminus A)$.

Notar que si A es abierto y cerrado entonces $FrA = \emptyset$.

Los puntos de la frontera los podemos caracterizar como sigue:

Proposición 1.22. Sea (X, τ) un espacio topológico. Sea $A \subset X$, entonces $x \in FrA$ si y sólo si $U \cap A \neq \emptyset$ y $U \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$ para todo $U \in \tau$ tal que $x \in U$, es decir, todo entorno de x corta a A y a su complementario.

Proposición 1.23. Sea (X, τ) un espacio topológico y $A \subset X$. Entonces:

1. $FrA = \overline{A} \setminus IntA$.
2. $\overline{A} = IntA \sqcup FrA$.
3. Si $FrA \cap FrB = \emptyset$ entonces $IntA \cup IntB = Int(A \cup B)$, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ y $Fr(A \cap B) = (FrA \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap FrB)$.

Demostración. Sólo el último punto lleva cierta dificultad. Sea $FrA \cap FrB = \emptyset$ y supongamos que existe un $x \in Int(A \cup B)$ tal que $x \notin IntA \cup IntB$, entonces $x \in X \setminus (IntA \cup IntB) = (X \setminus IntA) \cap (X \setminus IntB) = \overline{X \setminus A} \cap \overline{X \setminus B}$. Si $x \notin \overline{A}$ existirá $U \in \tau$ tal que $x \in U$ y $U \cap A = \emptyset$. Por otro lado, $x \in Int(A \cup B)$ implica que existe $V \in \tau$ tal que $x \in V \subset A \cup B$. Entonces $U \cap V \in \tau$ satisface $x \in U \cap V \subset V \subset A \cup B$ y $(U \cap V) \cap A \subset U \cap A = \emptyset$, lo cual implica que $x \in U \cap V \subset B$, es decir, $x \in IntB$ y llegamos a una contradicción ya que $x \notin IntA \cup IntB$. Necesariamente tenemos que $x \in \overline{A}$ y análogamente podríamos ver que $x \in \overline{B}$. Luego $x \in \overline{A} \cap \overline{B} \cap X \setminus \overline{A \cap B} = FrA \cap FrB$, lo que contradice la hipótesis de que las fronteras de A y B son disjuntas. Necesariamente tenemos que $x \in IntA \cup IntB$ y por tanto $Int(A \cup B) \subset IntA \cup IntB$. El otro contenido se satisface sin restricciones y tenemos la igualdad. Por otra parte, notar que $X \setminus \overline{A \cap B} = Int(X \setminus A \cap B) = Int[(X \setminus A) \cup (X \setminus B)] = Int(X \setminus A) \cup Int(X \setminus B)$, ya que $Fr(X \setminus A) \cap Fr(X \setminus B) = FrA \cap FrB = \emptyset$, pero $Int(X \setminus A) \cup Int(X \setminus B) = (X \setminus \overline{A}) \cup (X \setminus \overline{B}) = X \setminus (\overline{A} \cap \overline{B})$ y así $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}$. Finalmente, tenemos que $Fr(A \cap B) = \overline{A \cap B} \cap \overline{X \setminus (A \cap B)} = \overline{A \cap B} \cap (X \setminus \overline{A \cup B}) = (\overline{A \cap B} \cap X \setminus \overline{A}) \cup (\overline{A \cap B} \cap X \setminus \overline{B}) = (FrA \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap FrB)$.

□

Definición 1.24. Sea (X, τ) un espacio topológico y $A \subset X$. Definimos el **exterior** de A como el interior de su complementario. Así, $ExtA = Int(X \setminus A)$. Notar que $X = IntA \sqcup FrA \sqcup ExtA$ para todo $A \subset X$. Un punto $x \in A$ se dirá **aislado** si existe un abierto U en X tal que $U \cap A = \{x\}$. Denotaremos por $Ais(A)$ el conjunto de los

puntos aislados de A . Notar que $\overline{A} = \text{Ais}(A) \sqcup A'$, en particular si $A' = \emptyset$ entonces todo punto de A es aislado.

Definición 1.25. Sea (X, τ) un espacio topológico. Un subconjunto $D \subset X$ se dice **denso** en X si $\overline{D} = X$, o equivalentemente si para todo abierto U en X se tiene $U \cap D \neq \emptyset$.

Tanto los racionales como los irracionales son densos en \mathbb{R} .

Veamos ahora un ejemplo en el que repasemos todos los distintos tipos de puntos en un espacio topológico:

Ejemplo 1.25.1. Sea (\mathbb{R}, τ_u) la recta real y $A = (0, 1] \subset (\mathbb{R}, \tau_u)$.

1. El conjunto de los puntos interiores, $\text{Int}A = (0, 1)$. En efecto, para cualquier $x \in (0, 1)$ existe un $\varepsilon > 0$ tal que $x \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset (0, 1)$. Y cualquier otro punto de la recta, incluido el 1, no cumple esta condición.
2. La clausura de A , $\overline{A} = [0, 1]$. Dado $x \in [0, 1]$ y un abierto (a, b) tal que $x \in (a, b)$, siempre se va a tener que $(a, b) \cap (0, 1] \neq \emptyset$. Sin embargo, si $x \notin [0, 1]$ siempre podemos encontrar un abierto (a, b) tal que $x \in (a, b)$ y $(a, b) \cap [0, 1] = \emptyset$.
3. El derivado de A , $A' = [0, 1]$. Dado cualquier $x \in [0, 1]$ y un abierto (a, b) que lo contenga, siempre se tiene que $((a, b) \setminus \{x\}) \cap (0, 1] \neq \emptyset$. Por el contrario, si $x \notin [0, 1]$ siempre podemos encontrar un abierto (a, b) que lo contenga y $((a, b) \setminus \{x\}) \cap [0, 1] = \emptyset$.
4. El conjunto de los puntos aislados de A , $\text{Ais}(A) = \emptyset$. Y es que no existe ningún punto $x \in \mathbb{R}$ tal que un abierto (a, b) que lo contenga interseque a $(0, 1]$ únicamente en el punto x .
5. La frontera de A , $\text{Fr}A = \{0, 1\}$. Los únicos puntos x tales que cualquier abierto (a, b) con $x \in (a, b)$ que verifican que intersecan tanto a $(0, 1]$ como a sus complementarios $\mathbb{R} \setminus (0, 1]$ son el 0 y el 1.

■

Ejemplo 1.25.2. Si consideramos ahora como espacio topológico \mathbb{Z} dotado de la topología usual entonces, dado un entero $z \in \mathbb{Z}$, existe un intervalo, por ejemplo $z \in (z - 1, z + 1)$, que corta a \mathbb{Z} en únicamente el punto z . Así, todos los puntos de \mathbb{Z} son aislados, frontera y los únicos que conforman la clausura, ya que para todo $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ se tiene que $x \in ([x], [x] + 1) \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ (recordemos que la función suelo $\lfloor x \rfloor = \max\{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}$), luego tampoco hay puntos interiores ni de acumulación. Así, tenemos que $\overline{\mathbb{Z}} = \text{Ais}(\mathbb{Z}) = \text{Fr}\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ y $\text{Int}\mathbb{Z} = \mathbb{Z}' = \emptyset$.

Notar que el conjunto de los puntos interiores es vacío porque todo abierto que contenga a un punto $z \in \mathbb{Z}$ será de la forma $(z - \varepsilon, z + \varepsilon)$ y este abierto siempre pertenece a $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

■

2. Aplicaciones continuas y homeomorfismos
3. Separación y numerabilidad
4. Espacios métricos
5. Compacidad
6. Conexión