

# Topología general

Pablo Pallàs

31 de mayo de 2023

## Índice

1. Espacios topológicos	1
1.1. Espacios topológicos . . . . .	1
2. Aplicaciones continuas y homeomorfismos	4
3. Separación y numerabilidad	4
4. Espacios métricos	4
5. Compacidad	4
6. Conexión	4

## 1. Espacios topológicos

### 1.1. Espacios topológicos

Sea  $X$  un conjunto y  $\mathcal{P}(X) = \{A : A \subset X\}$  el conjunto de sus partes, entonces:

**Definición 1.1.** Una **topología** sobre un conjunto  $X$  es un subconjunto  $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$  que satisface:

- I. El conjunto vacío  $\emptyset$  y el conjunto total  $X$  pertenecen a  $\tau$ .
- II. La unión arbitraria de elementos de  $\tau$  también pertenece a  $\tau$ .
- III. La intersección finita de elementos de  $\tau$  también pertenece a  $\tau$ .

El par  $(X, \tau)$  lo denominaremos **espacio topológico** y a los elementos de  $\tau$  los llamaremos **abiertos**.

Es decir, podríamos decir que una topología es una colección de subconjuntos que contiene al vacío y al total, y que es cerrada para las uniones arbitrarias y las intersecciones finitas.

**Ejemplo 1.1.1.** Sea  $X$  un conjunto arbitrario y  $\tau_D = \mathcal{P}(X)$ . Entonces,  $\tau_D$  es una topología en  $X$  ya que contiene a todos los subconjuntos de  $X$ , en particular al vacío y al total, es cerrada para las uniones arbitrarias y para las intersecciones finitas. A esta topología la denominaremos **topología discreta**, y al conjunto  $X$  dotada de esta topología **espacio discreto**.

**Ejemplo 1.1.2.** Sea  $X$  un conjunto arbitrario y  $\tau_I = \{\emptyset, X\}$ . Entonces la colección  $\tau_I$  es una topología sobre  $X$ : contiene al vacío y al total, la unión de ambos es  $X \in \tau_I$  y la intersección es  $\emptyset \in \tau_I$ . Esta topología la denominaremos **topología indiscreta**, y es la topología más simple que puede tener un conjunto. A un conjunto  $X$  dotado con esta topología lo denominaremos **espacio indiscreto**.

**Definición 1.2.** Dos topologías  $\tau_1, \tau_2$  sobre un conjunto  $X$  se dicen **comparables** si  $\tau_1 \subset \tau_2$  ó  $\tau_2 \subset \tau_1$ . Si  $\tau_1 \subset \tau_2$  diremos que  $\tau_2$  es más **fina** (tiene más abiertos) que  $\tau_1$ .

Intuitivamente podríamos decir que una topología  $\tau'$  es más fina que otra  $\tau$  si tiene todos los abiertos de  $\tau$  y algunos más. Una topología más fina distingue de forma "más fina" los puntos y sus alrededores. Evidentemente, sobre un conjunto  $X$  cualquiera la topología más fina que podemos encontrar es la topología discreta  $\tau_D$ . Por otra parte, la topología indiscreta  $\tau_I$  es la menos fina que podemos encontrar. Luego cualquier otra topología  $\tau$  se encontrará entre estas dos:  $\tau_I \subseteq \tau \subseteq \tau_D$ .

Notar que si  $\tau_1$  y  $\tau_2$  son dos topologías sobre  $X$  es fácil ver que  $\tau_1 \cap \tau_2$  es una topología sobre  $X$ . En general, la unión  $\tau_1 \cup \tau_2$  no es necesariamente una topología.

**Ejemplo 1.2.1.** Consideremos el siguiente conjunto:

$$\tau_u = \{U \subset \mathbb{R} : \forall x \in U \exists \epsilon > 0 \text{ t.q. } (x - \epsilon, x + \epsilon) \subset U\}.$$

Entonces:

1.  $\emptyset \in \tau_u$  trivialmente y  $\mathbb{R} \in \tau_u$  ya que si tenemos un  $x \in \mathbb{R}$  y  $\epsilon = 1$ , entonces  $(x - 1, x + 1) \in \mathbb{R}$ .
2. Dada  $\{U_i\}_{i \in J}$  una colección arbitraria de elementos de  $\tau_u$  entonces, si consideramos un  $x \in \cup_i U_i$  existirá un  $i_0 \in J$  tal que  $x \in U_{i_0}$ . Como  $U_{i_0} \in \tau_u$  existirá un  $\epsilon > 0$  tal que  $(x - \epsilon, x + \epsilon) \subset U_{i_0} \subset \cup_i U_i$  y así  $\cup_i U_i \in \tau_u$ .
3. Sean  $U, V \in \tau_u$ ,  $x \in U \cap V$ . Como  $x \in U$  existirá un  $\epsilon_1 > 0$  tal que  $(x - \epsilon_1, x + \epsilon_1) \subset U$ . Como  $x \in V$  existirá un  $\epsilon_2 > 0$  tal que  $(x - \epsilon_2, x + \epsilon_2) \subset V$ . Ahora, si escogemos  $\epsilon = \min\{\epsilon_1, \epsilon_2\}$  entonces tendremos:

$$(x - \epsilon, x + \epsilon) \subset U \subset U \cap V$$

$$(x - \epsilon, x + \epsilon) \subset V \subset U \cap V$$

y así  $U \cap V \in \tau_u$ .

Luego  $\tau_u$  es una topología, que denominaremos **topología usual**. Al espacio topológico  $(\mathbb{R}, \tau_u)$  lo denominaremos **recta real**.

□

**Definición 1.3.** Sea  $(X, \tau)$  un espacio topológico, un conjunto  $\mathfrak{B} \subset \tau$  de abiertos se dice **base** de  $\tau$  si todo elemento de  $\tau$  es unión de elementos de  $\mathfrak{B}$ . A estos elementos de  $\mathfrak{B}$  los denominaremos **abiertos básicos**.

**Ejemplo 1.3.1.** Veamos algunos ejemplos:

1. La propia topología  $\tau$  es base de sí misma.
2. Es claro que  $\mathfrak{B} = \{\{x\} : x \in X\}$  es base de la topología discreta  $\tau_D$  sobre  $X$ .
3. El conjunto de intervalos  $\mathfrak{B}_U = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$  es una base para la topología usual sobre  $\mathbb{R}$ ,  $\tau_U$ .

**Proposición 1.4.** Sea  $(X, \tau)$  un espacio topológico, entonces  $\mathfrak{B} \subset \tau$  es una base si y sólo si para todo  $U \in \tau$  y todo  $x \in U$  existe  $B \in \mathfrak{B}$  tal que  $x \in B \subset U$ .

*Demostración:* Sea  $x \in U$ , si  $\mathfrak{B} = \{B_i : B_i \in \tau\}$  es una base entonces  $U = \bigcup B_i$ , por lo que existirá  $B_k \in \mathfrak{B}$  tal que  $x \in B_k \subset U$ . Recíprocamente, dado  $U \in \tau$ , si para todo  $x \in U$  existe  $B_i \in \mathfrak{B}$  tal que  $x \in B_i \subset U$  entonces es claro que  $U = \bigcup B_i$ .

□

**Proposición 1.5.** Sea  $(X, \tau)$  un espacio topológico y  $\mathfrak{B} \subset \tau$  una base, entonces  $U \subset X$  es un abierto si y sólo si para todo  $x \in U$  existe un  $B \in \mathfrak{B}$  tal que  $x \in B \subset U$ .

Luego:

**Corolario 1.5.1.** Sea  $(X, \tau)$  un espacio topológico y  $A \subset X$ , entonces  $A$  es abierto si y sólo si para todo  $x \in A$  existe un abierto  $U \in \tau$  tal que  $x \in U \subset A$ .

Sin embargo, no toda familia de partes de un conjunto es una base para una topología. Para identificar a estos conjuntos especiales tenemos el siguiente resultado:

**Proposición 1.6.** Sea  $\mathfrak{B} \subset \mathcal{P}(X)$  satisfaciendo:

1. Para todo  $x \in X$  existe un  $B \in \mathfrak{B}$  tal que  $x \in B$ .
2. Dados  $B_1, B_2 \in \mathfrak{B}$  y  $x \in B_1 \cap B_2$  existe  $B \in \mathfrak{B}$  tal que  $x \in B \subset B_1 \cap B_2$

Entonces, el conjunto  $\tau_{\mathfrak{B}} \subset \mathcal{P}(X)$  definido por  $U \in \tau_{\mathfrak{B}}$  si y sólo si para todo  $x \in U$  existe  $B \in \mathfrak{B}$  tal que  $x \in B \subset U$  es una topología sobre  $X$  que tiene a  $\mathfrak{B}$  como base. Llamaremos a  $\tau_{\mathfrak{B}}$  topología generada por  $\mathfrak{B}$ .

*Demostración.* Trivialmente se tiene que  $\emptyset \in \tau_{\mathfrak{B}}$  y también está claro que  $X \in \tau_{\mathfrak{B}}$ .

Sea ahora  $\{U_i\}_{i \in J} \subset \tau_{\mathfrak{B}}$  y  $U = \bigcup_i U_i$ , dado un  $x \in U$  entonces  $x \in U_k$  para algún  $k \in J$  y existirá  $B \in \mathfrak{B}$  tal que  $x \in B \subset U_k \subset U$ , por lo que  $U \in \tau_{\mathfrak{B}}$ .

Sean ahora  $U_1$  y  $U_2 \in \tau_{\mathfrak{B}}$  y veamos que  $U_1 \cap U_2 \in \tau_{\mathfrak{B}}$ , en efecto, dado  $x \in U_1 \cap U_2$  existirán  $B_1, B_2 \in \mathfrak{B}$  tales que  $x \in B_1 \subset U_1$  y  $x \in B_2 \subset U_2$ , entonces  $x \in B_1 \cap B_2$  y así existirá un  $B \in \mathfrak{B}$  tal que  $x \in B \subset B_1 \cap B_2 \subset U_1 \cap U_2$ , por lo que  $U_1 \cap U_2 \in \tau_{\mathfrak{B}}$ .

Por inducción finita se sigue para cualquier subfamilia finita  $\{U_1, \dots, U_n\} \subset \tau_{\mathfrak{B}}$ . Se concluye así que  $\tau_{\mathfrak{B}}$  es una topología sobre  $X$  con base  $\mathfrak{B}$ .

□

**Proposición 1.7.** Sean  $\mathfrak{B}_1$  y  $\mathfrak{B}_2$  bases de sendas topologías  $\tau_1$  y  $\tau_2$  sobre un conjunto  $X$ , entonces  $\tau_2$  es más fina que  $\tau_1$ , es decir,  $\tau_1 \subset \tau_2$  si y sólo si para todo  $x \in X$  y todo  $B_1 \in \mathfrak{B}_1$  tal que  $x \in B_1$  existe  $B_2 \in \mathfrak{B}_2$  tal que  $x \in B_2 \subset B_1$ .

*Demostración.* Supongamos que  $\tau_1 \subset \tau_2$ , dado  $x \in X$  y  $B_1 \in \mathfrak{B}_1$  tal que  $x \in B_1$ , en particular  $B_1 \in \tau_1$  y por tanto  $B_1 \in \tau_2$ , entonces existe  $B_2 \in \mathfrak{B}_2$  tal que  $x \in B_2 \subset B_1$ .

Recíprocamente, si  $U \in \tau_1$  existirá  $B_1 \in \mathfrak{B}_1$  tal que  $x \in B_1 \subset U$  y como existe  $B_2 \in \mathfrak{B}_2$  tal que  $x \in B_2 \subset B_1$  se tiene entonces que  $x \in B_2 \subset U$  y por tanto se sigue que  $U \in \tau_2$ .

□

**Ejemplo 1.7.1.** La familia  $\mathfrak{B}_S$  de los intervalos semiabiertos de la forma  $[a, b)$  satisfacen las condiciones de , luego forman base de una topología  $\tau_S$  sobre  $\mathbb{R}$ . Al espacio topológico  $(\mathbb{R}, \tau_S)$  ó simplemente  $\mathbb{R}_S$  se le conoce como **recta de Sorgenfrey**.

Notar que para todo  $x \in \mathbb{R}$  y todo intervalo  $(a, b)$  tal que  $x \in (a, b)$  está claro que  $x \in [x, b) \subset (a, b)$ , por lo que  $\tau_U \subset \tau_S$ , y como  $[a, b) \notin \tau_U$  se sigue que la topología de Sorgenfrey es estrictamente más fina que la usual.

■

**Definición 1.8.**

## 2. Aplicaciones continuas y homeomorfismos

## 3. Separación y numerabilidad

## 4. Espacios métricos

## 5. Compacidad

## 6. Conexión