

**Определение.** Пусть задано измеримое пространство  $(\Omega, \mathcal{F})$ . Функция  $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\xi = \xi(\omega)$ ,  $\omega \in \Omega$  называется *измеримой* функцией относительно  $\sigma$ -алгебры  $\mathcal{F}$ , если

$$\forall c \in \mathbb{R} \quad \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c\} \in \mathcal{F}$$

Назовем условием измеримости функцию, измеримую относительно  $\sigma$ -алгебры  $\mathcal{F}$ , также называют  $\mathcal{F}$ -измеримой функцией или функцией, согласованной с  $\sigma$ -алгеброй  $\mathcal{F}$

## Задача №1

$$\Omega = \{\heartsuit, \diamond, \spadesuit, \clubsuit\}, \mathcal{F} = \{\emptyset, \{\heartsuit, \diamond\}, \{\spadesuit\}, \{\clubsuit\}, \{\heartsuit, \diamond, \spadesuit\}, \{\heartsuit, \diamond, \clubsuit\}, \{\spadesuit, \clubsuit\}, \Omega\}, \xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \eta : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$\omega$	$\heartsuit$	$\diamond$	$\spadesuit$	$\clubsuit$
$\xi(\omega)$	1	1	2	3
$\eta(\omega)$	3	2	1	1

а) Является ли  $\xi$   $\mathcal{F}$ -измеримой? мяу мяу мяу всем привет от яны

- 1)  $c > 3$  :  $\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c = 100\} = \emptyset \in \mathcal{F}$
- 2)  $c = 3$  :  $\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > 3\} = \emptyset \in \mathcal{F}$
- 3)  $c \in (2; 3)$  :  $\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c = 2.7\} = \{\clubsuit\} \in \mathcal{F}$
- 4)  $c = 2$  :  $\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > 2\} = \{\clubsuit\} \in \mathcal{F}$
- 5)  $c \in (1; 2)$  :  $\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c = 1.3\} = \{\spadesuit, \clubsuit\} \in \mathcal{F}$
- 6)  $c = 1$  :  $\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > 1\} = \{\spadesuit, \clubsuit\} \in \mathcal{F}$
- 7)  $c < 1$  :  $\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c = -200\} = \Omega \in \mathcal{F}$

б) Является ли  $\eta$   $\mathcal{F}$ -измеримой?

$$c = 2.5 : \{\omega \in \Omega : \eta(\omega) > 2.5\} = \{\heartsuit\} \notin \mathcal{F} \implies \text{не является } \mathcal{F}\text{-измеримой}$$

## №2

$\Omega = \mathbb{R}$ ,  $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ,  $\xi(\omega) = \omega^2$ . Определить,  $\xi$  —  $\mathcal{F}$ -измерима?

$$\bullet c < 0 : \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c\} = \{\omega \in \mathbb{R} : \underbrace{\omega^2}_{\geq 0} > c\} = \mathbb{R} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

$$\bullet c \geq 0 :$$

$$\begin{aligned} \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c\} &= \{\omega \in \mathbb{R} : \omega^2 > c\} \\ &= \{\omega \in \mathbb{R} : \omega < -\sqrt{c}\} \cup \{\omega \in \mathbb{R} : \omega > \sqrt{c}\} \\ &= (-\infty; -\sqrt{c}) \cup (\sqrt{c}; +\infty) \\ &= \underbrace{\mathbb{R}}_{\in \mathcal{B}(\mathbb{R})} \setminus \underbrace{[-\sqrt{c}; \sqrt{c}]}_{\in \mathcal{B}(\mathbb{R})} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \in \mathcal{F} \end{aligned}$$

## №3

$(\Omega, \mathcal{F})$  — измеримое пространство,  $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  —  $\mathcal{F}$ -измеримая функция  $\forall c \in \mathbb{R}$

Доказать утверждения

$$\text{а) } \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \geq c\}}_{=LHS} = \underbrace{\bigcap_{i=1}^n \left\{ \omega \in \Omega : \xi(\omega) > c - \frac{1}{n} \right\}}_{=RHS} \in \mathcal{F}$$

- $(LHS \subseteq RHS): \omega_0 \in LHS \implies \xi(\omega) \geq c \implies \forall n \in \mathbb{N} : \xi \omega_0 > c - \frac{1}{n} \implies \omega_0 \in RHS$
- $(RHS \subseteq LHS): \omega_0 \in RHS \implies \forall n \in \mathbb{N} : \xi(\omega_0) > c - \frac{1}{n} \implies \xi(\omega_0) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} (c - \frac{1}{n}) = c \implies \omega_0 \in LHS$

$$\text{b) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = c\} = \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \geq c\}}_{\in \mathcal{F}(\text{см. п. а})} \setminus \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c\}}_{\in \mathcal{F}(\text{по опр. } \mathcal{F}\text{-изм. ф-и})} \in \mathcal{F}$$

$$\text{c) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\} = \underbrace{\Omega}_{\in \mathcal{F}} \setminus \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c\}}_{\in \mathcal{F}(\text{по опр. } \mathcal{F}\text{-изм. ф-и})} \in \mathcal{F}$$

$$\text{d) } \{\omega \in \omega : \xi(\omega) < c\} = \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\}}_{\in \mathcal{F}(\text{см. п. с})} \setminus \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = c\}}_{\in \mathcal{F}(\text{см. п. б})}$$

## №4

$(\Omega, \mathcal{F})$  — измеримое пространство,  $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  —  $\mathcal{F}$ -измеримая функция

Докажите, что  $\xi^2(\omega)$  —  $\mathcal{F}$ -измерима

- $c < 0 : \{\omega \in \Omega : \xi^2(\omega) > c\} = \Omega \in \mathcal{F}$
- $c \geq 0 : \{\omega \in \Omega : \xi^2(\omega) > c\} = \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) < -\sqrt{c}\}}_{\in \mathcal{F}(\text{см. п. 3d})} \cup \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > \sqrt{c}\}}_{\in \mathcal{F}(\text{по опр. } \mathcal{F}\text{-изм. ф-и})} \in \mathcal{F}$