

## CÁLCULO

1. Estudia el número de soluciones de la ecuación  $4x^7 + 2x^3 + 3x + 1 = 0$ . (1.5 ptos.)

*Solución.* La función  $f(x) = 4x^7 + 2x^3 + 3x + 1$  es derivable y su derivada es

$$f'(x) = 28x^6 + 6x^2 + 3.$$

La derivada es positiva en todo  $\mathbb{R}$  (son potencias pares) y, por tanto, la función es estrictamente creciente. Como  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  y  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ , la función sólo se anula una vez.

2. Calcula los siguientes límites:

a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - \cos(x))}{x - \sin(x)}$ . (1.5 ptos.)

*Solución.* Estamos en las condiciones de la primera regla de L'Hôpital. Vamos a usarla:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - \cos(x))}{x - \sin(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x) + x \sin(x)}{1 - \cos(x)}.$$

Como  $\frac{1 - \cos(x)}{1 - \cos(x)}$  es uno, sólo tenemos que resolver el resto. Para ello aplicamos de nuevo la regla de L'Hôpital,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(x)}{1 - \cos(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) + x \cos(x)}{\sin(x)} = 2.$$

Resumiendo,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - \cos(x))}{x - \sin(x)} = 3$ .

b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\tan(x^2)}{x^2} \right)^{1/x}$ . (1.5 ptos.)

*Solución.* En la base tenemos una indeterminación de la forma  $0/0$ . Usamos la regla de L'Hôpital para calcular su límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x^2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \tan^2(x^2))2x}{2x} = 1.$$

Como la base tiende a uno, aplicamos la regla del número  $e$ , y calculamos el siguiente límite usando la regla de L'Hôpital

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left( \frac{\tan(x^2)}{x^2} - 1 \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x^2) - x^2}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \tan^2(x^2))2x - 2x}{3x^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \tan^2(x^2)) - 1}{x^2} \\
&= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \tan(x^2) (1 + \tan^2(x^2)) 2x}{2x} = 0.
\end{aligned}$$

Por tanto, el límite pedido vale uno.

3. Calcula la imagen de la función  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida como (2 pts.)

$$f(x) = \begin{cases} x \log |x|, & \text{si } x \neq 0 \\ 0, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

*Solución.* En primer lugar, la función es impar con lo que podemos ahorrarnos el estudio de la función en  $\mathbb{R}^-$ . Si no nos damos de cuenta de esto, el cálculo es similar al que vamos a hacer en  $[0, +\infty[$ . Además de esto, usaremos que  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = 1$ , límite que ya hemos visto en clase.

- La función es continua en todo  $\mathbb{R}$ . El único punto dudoso es el origen, pero el límite mencionado antes nos lo resuelve.
- La función no es derivable en 0: usando la definición de derivada

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \log |x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \log |x| = -\infty.$$

En  $\mathbb{R}^+$ ,  $f'(x) = \log(x) + 1$

- Puntos críticos (en  $\mathbb{R}^+$ ):  $f'(x) = 0 \iff x = 1/e$ .
- Viendo el signo de la derivada, la función es estrictamente decreciente en  $] -1/e, e[$  y estrictamente creciente en  $]1/e, +\infty[$ .
- $f([0, +\infty[) = [f(1/e), f(0)] \cup [f(1/e), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[ = [-1/e, 0] \cup [0, +\infty[ = [-1/e, +\infty[$ .
- $f(\mathbb{R}) = f([0, +\infty[) \cup f(]-\infty, 0]) = [-1/e, +\infty[ \cup ]-\infty, 1/e] = \mathbb{R}$ .

No es necesario pasar por todo el proceso anterior para llegar al mismo resultado: sólo es necesario usar que la función es continua y calcular sus límites en  $+\infty$  y  $-\infty$  para obtener que  $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ .

4. Sea  $f(x) = \sin(x) \cos(x)$ . (2 pts.)

- a) Calcula su polinomio de Taylor de orden 2 centrado en cero.
- b) Acota el error obtenido al usar dicho polinomio para calcular  $\sin(2) \cos(2)$ .

*Solución.* Si  $f(x) = \sin(x) \cos(x)$ ,

$$f'(x) = \cos^2(x) - \sin^2(x), \quad f'(0) = 1$$

$$f''(x) = -2 \cos(x) \sin(x) - 2 \sin(x) \cos(x) = -4 \sin(x) \cos(x), \quad f''(0) = 0,$$

$$f'''(x) = -4(\cos^2(x) - \sin^2(x)).$$

El polinomio de Taylor de  $f$  en cero es

$$f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 = x.$$

El error cometido, usando que seno y coseno en valor absoluto son menores que uno, se puede acotar de la siguiente forma

$$|R_2(2)| = \left| \frac{f'''(c)}{3!}(2-0)^3 \right| = \left| \frac{-4(\cos^2(c) - \sin^2(c))}{3!}2^3 \right| \leq 64/6 = 32/3.$$

5. Discute para que valores es cierta la desigualdad  $|x + 3| \leq |x - 1|$ . (1.5 pts.)

*Solución.*

$$|x + 3| \leq |x - 1| \iff (x + 3)^2 \leq (x - 1)^2 \iff 8x + 8 \leq 0 \iff x \leq -1.$$