



วิธีการบรรเทาอาการ เจ็บครรภ์คลอด



โดย ห้องคลอดรพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน

เทคนิคการบรรเทาอาการเจ็บครรภ์โดยไม่ใช้ยา มีวิธีการต่าง ๆ ได้แก่

1. การใช้เทคนิคการหายใจ (Breathing technique)
2. การใช้เทคนิคการสัมผัสลูบ
3. การนวด
4. การใช้ดนตรีบำบัด
5. การเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนท่า





1.การใช้เทคนิคการหายใจ (Breathing technique)


คือการใช้เทคนิคการหายใจช่วยตอบสนอง
ต่อการคลอด และการหดตัวของมดลูกที่ถี่และแรงขึ้น
เรื่อยๆ โดยการพ่วงจุดสนใจไปที่การหายใจซึ่งการใช้
เทคนิคหายใจส่วนใหญ่ต้องเริ่มสอนตั้งแต่ฝากครรภ์
เพื่อเตรียมความพร้อมและให้สตรีตั้งครรภ์ได้มีการฝึก
หายใจ แต่ละแบบจนชำนาญก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ
คลอด



การหายใจแบบต่างๆ ดังนี้

แบบที่ 1 การหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ


ใช้ในระยะปากมดลูกเปิดไม่เกิน 3 ซม. เมื่อมดลูกเริ่มหดตัวให้ผู้คลอดหายใจยาวและลึกเพื่อล้างปอด 1 ครั้ง จากนั้นหายใจเข้าทางจมูกช้า ๆ นับ 1-4 แล้วผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆ นับ 1-5 หรือ ใช้วิธีหายใจเข้า และออกลึกๆ ทางจมูกช้า ๆ ทุกครั้งที่มดลูกหดตัว ให้ผู้คลอดหายใจยาวและลึก เพื่อล้างปอด 1 ครั้ง จากนั้นหายใจตามปกติ



แบบที่ 2 หายใจแบบเร็วขึ้นและเบา

ใช้ในระยะปากมดลูกเปิด 4 - 7 เซนติเมตร คือเมื่อมดลูกเริ่มตันหดรัดตัว ให้ผู้คลอดหายใจยาวและลึกเพื่อล้างปอด 1 ครั้งจากนั้นให้หายใจช้าๆ จนกระทั่งมดลูกหดรัดตัวมากขึ้น จึงหายใจเข้าและออกผ่านทั้งทางปากและจมูกสั้น เร็ว และเบา ให้รู้สึกว่าหายใจแค่คอไม่ต้องออกแรง เมื่อมดลูกเริ่มคลายตัว ให้กลับไปหายใจแบบช้า จนมดลูกคลายตัวเต็มที่ ให้หายใจล้างปอดอีกครั้ง





แบบที่ 3 หายใจแบบหอบสลับเป่าปาก

ใช้ในระยะปากมดลูกเปิด 8-10 เซนติเมตร ระยะนี้
มดลูกหดตัวแรงมาก เมื่อมดลูกเริ่มหดตัวให้หายใจยาวและ
ลึก เพื่อล้างปอด 1 ครั้ง จากนั้นหายใจเข้าและออกทางปากสั้นๆ
เร็วๆเบาๆ ติดต่อกัน 3 ครั้ง แล้วเป่าลมออก 1 ครั้ง ต่อเนื่องไปจน
มดลูกคลายตัว จึงหายใจล้างปอดอีกครั้ง







แบบที่ 4 การหายใจเพื่อการแบ่ง



ใช้ในระยะแบ่งตลอด โดยเริ่มด้วยการหายใจล่างปอด
1-2 ครั้ง จากนั้นหายใจเข้าทางปากและทางจมูกให้ลึกที่สุด
กลั้นเล็กน้อย แล้วแบ่งลงข้างล่างให้แรงดันออกมาทางช่อง
คลอดทำซ้ำ 2-3 ครั้ง เมื่อมดลูกคลายตัวจึงหายใจล่างปอด
1-2 ครั้ง







การใช้เทคนิคการสัมผัสลูก

การลูบหน้าท้อง เป็นการกระตุ้นทางผิวหนังด้วยการสัมผัส ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนคลาย ลดอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อ สามารถลดความปวดได้โดยมีวิธี ดังนี้



2.1 ลูบหน้าท้อง โดยการใช้ปลายฝ่ามือทั้ง 5 นิ้ว นวดเป็นวงกลมด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอบริเวณหน้าท้องโดยวนเป็นรูปวงกลมทำซ้ำเวลามดลูกหดรัดตัว

2.2 ลูบหน้าท้องเมื่อมดลูกหดรัดตัวให้ผู้คลอดใช้อุ้งมือทั้งสองข้างลูบหรือนวดเบาๆ โดยเริ่มจากบริเวณหัวเข่าขึ้นไปหายอดมดลูกในขณะหายใจเข้า และจากมดลูกผ่านมาที่จุดเริ่มต้นใหม่ขณะที่มีการหายใจออก



3. การนวด


ในระยะตั้งครรภ์จนถึงระยะคลอดนั้นสามารถทำให้เกิดการผ่อนคลายเป็นการเพิ่มการไหลเวียนและลดการปวดเมื่อย ผู้คลอดจะรู้สึกว่าได้พักและสบายตัวมากยิ่งขึ้นและเมื่ออายุครรภ์มากขึ้น จะมีน้ำหนักมากขึ้น ทำให้ผู้คลอดจะรู้สึกไม่คล่องตัวปวดเมื่อยตามหลังและแขนขา ดังนั้นการเรียนรู้การนวดด้วยตนเองในบางท่าและได้รับการนวดโดยผู้ดูแลในบางท่าจะสามารถบรรเทาอาการปวดที่เกิดขึ้นได้ โดยวิธีการนวดดังนี้





มีวิธีการนวด ดังนี้

- 3.1 การใช้ปลายนิ้วกดหรือเคาะเบาๆ คล้ายๆ เม็ดฝนตก ลงมา/ปลายนิ้วลูบกดนวดเบาๆ ขึ้นลง
- 3.2 การนวดโดยเข้าฝ่ามือลูบ เป็นการสัมผัสที่เพิ่ม น้ำหนักมากกว่าวิธีการที่ 1 คล้ายๆ กับการรีดผ้า
- 3.3 การนวดโดยใช้ฝ่ามือกด ใช้ฝ่ามือทั้ง 2 ข้างกดไป ให้มีน้ำหนักโดยกดสลับมือเหมือนการเดิน
- 3.4 การนวดโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดลึก
- 3.5 การนวดโดยใช้มือบีบกล้ามเนื้อสลับปล่อย



การนวดส่วนต่างๆ ดังนี้

การนวดหลังในท่านั่ง โดย

1.ผู้คลอดนั่งคุกเข่าโน้มตัวไปข้างหน้าชบหน้ากับหมอนแยก
เข่าออกจากกันปลายเท้าชี้เข้าหากัน หรือนั่งคร่อมเก้าอี้หันหน้า
ชบบนพนักพิง ผู้ดูแลนั่งคุกเข่าอยู่ด้านหลังในท่าหลังตรง

2.วางฝ่ามือทาบบริเวณส่วนปลายของกระดูกสันหลังให้สันมือ
อยู่ใกล้กับกระดูกก้นกบมากที่สุด แล้วใช้แรงจากฝ่ามือกดเดิน
สลับซ้ายและขวาเบาๆ ขณะที่มดลูกมีการหดรัดตัวกดจากก้นกบ
ไปตามแนวข้างกระดูกสันหลังจนถึงส่วนบนบริเวณกล้ามเนื้อ
สะบักและไหล่หรือใช้ฝ่ามือลูบขึ้นลงไปตามแนวเดิม แต่การลูบ
ต้องให้น้ำหนักหรือใช้นิ้วกดลึกหรือกดคลึงตามแนวเดิม





การนวดหลังในท่านอนตะแคง โดย

1. ผู้คลอดนอนตะแคงในลักษณะขาล่างเหยียดตรง ขาบนงอเล็กน้อยมีหมอนสอดระหว่างขา หรือรองรับตลอด เข่าจนถึงเท้า

ผู้ดูแลนั่งด้านหลังผู้คลอดเพื่อนวดหลัง/สะโพก

2. ใช้ฝ่ามือคลึงหรือลูบจากสะโพกไปถึงไหล่ โดยฝ่ามืออยู่ข้างแนวกระดูกสันหลัง นวดไปตามแนวยาวของลำตัว จนถึงสะบักหรือไหล่หรือใช้นิ้วกดคลึงตามแนวเดิม

3. ถ้าคลอดอ้วนและชอบการนวดแบบลงน้ำหนักมาก ให้ใช้การนวดแบบกดลึก ใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไปตรงๆ นิ่งๆ นานประมาณ 10 วินาที จึงย้ายตำแหน่งให้ทั่วบริเวณ ตามแนวเดิม



การนวดขาส่วนบน น่อง และเท้า




1. นั่งบนเก้าอี้ หรือนั่งกับพื้นด้วยท่าที่สบาย
แยกขาผู้ดูแลยืน หรือนั่งคุกเข่าตรงหน้า ใช้ฝ่ามือ 2
ข้างกดนวดเดินสลับมือจากเข่ามายังต้นขาด้านในถึง
ขาหนีบทำเป็นจังหวะใช้สอดคล้องกับจังหวะการหายใจ


2. กรณีที่มีอาการของตะคริว ให้วางเท้าข้าง
หนึ่งบนตักผู้ดูแล ผู้ดูแลช่วยหลักปลายเท้าเข้าหาตัว
ผู้คลอด แล้วใช้มือ นวดคลึงหลังเท้า ข้างเท้าและข้อเท้า
เบาๆ




4. การใช้ดนตรีบำบัด



ดนตรีมีคุณสมบัติก่อให้เกิดความสงบ
ส่งเสริมการผ่อนคลายความวิตกกังวลทำให้ต่อมได้
สมองมีการหลั่งสารเอ็นดอร์ฟินเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
การรับรู้ความปวดลดลง ดนตรีสามารถใช้ เพื่อ
ส่งเสริมการผ่อนคลายในระยะเริ่มแรกของการเจ็บ
ครรภ์และกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหว เมื่อมี
ความก้าวหน้าของการคลอด และเบี่ยงเบนความ
สนใจของผู้คลอดไปจากความปวด





การเลือกใช้ดนตรีในการลดความปวด
องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับจังหวะดนตรีที่เน้นฟัง
เพื่อการลดความวิตกกังวล คือ อัตราจังหวะของเพลง
ที่ประมาณ 60 – 80 ครั้งต่อนาที เป็นจังหวะที่เท่ากับ
อัตราการเต้นของหัวใจหรือการเดินตามปกติโดย
รูปแบบของจังหวะไม่ควรซับซ้อน มีความสม่ำเสมอ
รวมทั้งระดับเสียงหรือทำนองที่มีความเหมาะสม ไม่สูง
มากหรือต่ำมากเกินไป จะสามารถกระตุ้นให้เกิด
ความผ่อนคลายลดความวิตกกังวลและความปวดได้
เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายและลดความวิตก
กังวล ควรฟังดนตรีต่อเนื่องอย่างน้อย
ประมาณ 20 นาทีต่อครั้ง

5. การเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนท่า

ผู้คลอดควรเลือกอยู่ในท่าทำให้ตัวเองรู้สึกสบายมากที่สุด และควรเปลี่ยนท่าทุก 30 นาที หรือ 60 นาที การเคลื่อนไหวจะลดความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อ การจัดทำศีรษะและลำตัวสูง

- การจัดทำท่าระยะไม่ก้ำวหน้า หรือระยะปากมดลูกเปิดช้า ใช้ท่าลุกเดิน นั่งหรือนอนศีรษะสูง





- การจัดทำระยะก้าวหน้า หรือ ระยะปากมดลูกเปิดเร็ว ช่วยจัดทำให้ ผู้คลอด บนเตียง โดยใช้ท่าศีรษะและ ลำตัวสูงที่ผ่านการศึกษาวิจัย ได้แก่

5.1 **ท่าคลานคุกเข่า**ให้ผู้คลอดคุกเข่า ก้มตัวลง วางฝ่ามือทั้งสองข้างบนพื้น ห่างจากเข่าพอประมาณ โน้มลำตัวไปด้านหน้า หลังเท้าแนบพื้น แขนตั้งฉากหน้าตรง ตามองพื้น เมื่อครบ 10 – 15 นาที เปลี่ยนสลับ นั่งหรือนอนศีรษะสูง

ข้อดี : ลดอาการปวดหลังส่วนล่าง เนื่องจากการถ่ายน้ำหนักไปที่มือและเท้าทำให้ลดแรงกดที่หลังและก้นกบ, หมุนศีรษะการกให้ทำยทอยมาอยู่ด้านหน้าของช่องเชิงกราน



ข้อจำกัด : อยู่ในท่าได้ไม่นานเนื่องจากมีแรงกดที่เข่าและฝ่ามือ





5.2 **ท่าพีเอสยูแคท(PSU Cat)** คือให้ผู้คลอดหันหน้าไปทางหัวเตียงที่ยกสูง 45 – 60 องศา วางหน้าและอกบนหมอน เช้าวางบนที่นอนแยกห่างจากกันพอประมาณ ให้แนวลำตัวส่วนบนสูงกว่าส่วนล่างเล็กน้อย มดลูกอยู่ตรงกับลำตัวผู้คลอดในลักษณะคว่ำไปข้างหน้าให้ผู้คลอดหายใจเข้าโถ่งลำตัวขึ้นเมื่อมดลูกหดรัดตัว เพราะช่วยให้มดลูกโถ่งสูงขึ้นตามแนวยาว เกิดการส่งแรงผ่านตัวทารกดีส่วนนำของทารกยันกับช่องคลอดส่วนล่างของผู้คลอดมากขึ้น เมื่อมดลูกคลายตัว เมื่อครบ 10 – 15 นาที สลับเป็นนั่งหรือนอนศีรษะสูง

ข้อดี : ลดเวลาในระยะปากมดลูกเปิดเร็วลดแรงกดบริเวณหลังและก้นลดอาการเจ็บครรภ์คลอด และทำให้ผู้คลอดสดชื่นขึ้นเพราะรู้สึกเหมือนหลังอาบน้ำ



ข้อจำกัด : อยู่ในท่าได้ไม่นานเพราะคว่ำหน้ากับหมอนหายใจได้ไม่สะดวกและต้องตั้งเข่าทำให้เมื่อย





5.3 ทำคุกเข่า โน้มตัวไปข้างหน้าโอบ แขนและพับบนลูกบอลลูกที่มีความสูงระดับไหล่ มีวิธีการจัดทำ โดย อยู่ในท่านั่งคุกเข่าก้มตัวลง โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วโอบลูกบอลที่มีความสูงระดับไหล่ไว้หลัง ทำแบบฝึกหัด นาน 10 – 15 นาที เปลี่ยนสลับมานั่งในท่ากึ่งนั่ง 45 องศาหรือนอนศีรษะสูง

ข้อดี : ลดเวลาในระยะปากมดลูกเปิดเร็วลดแรงกดบริเวณหลังและก้นกบ ทำให้ลดอาการปวดหลังส่วนล่าง




ข้อจำกัด : อยู่ในท่าได้ไม่นาน เพราะต้องคุกเข่า ต้องการพนักที่กว้างพอ และเป็นสัดส่วนเนื่องจากใช้อุปกรณ์เป็นลูกบอลขนาดใหญ่กว้างกับพื้น



5.4 ทำผีเสื้อประยุกต์ มีวิธีการจัดทำโดย นั่งลำตัวตรง ฝ่าเท้าประกบกัน ดึงส้นเท้าชิดผีเสื้อมากเท่าที่ทำได้ โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ให้ลำตัวทำมุมประมาณ 15 องศา กับแนวตั้งวางศีรษะบนโต๊ะคร่อมเตียง(over bed) ที่มีหมอนนุ่มรองรับให้แขนทั้ง 2 ข้างวางข้างศีรษะ ทิ้งน้ำหนักตัวไปข้างหน้านั่งนานอย่างน้อย 15 นาที สลับกับทำนั่งเอนไปด้านหลัง ลักษณะทำนั่งผีเสื้อประยุกต์ เป็นท่าที่ดัดแปลงมาจากท่าผีเสื้อ ที่จัดฝ่าเท้าประกบกันส้นเท้าชิดผีเสื้อ จะช่วยสะโพกและบริเวณหัวหน้าของผู้คลอดขยายออก กล้ามเนื้อต้นขาและผีเสื้อมีการยืดขยายมากขึ้นจึงช่วยให้คลอดง่าย ทำอย่างน้อย 15 นาที สลับกับทำนั่งเอนไปด้านหลังหรือนอนตะแคงศีรษะสูง

ข้อดี : ลดอาการปวดหลังส่วนล่าง เนื่องจากการถ่ายน้ำหนักไปที่มือและเท้าทำให้ลดแรงกดที่หลังและก้น กบ, หมุนศีรษะการกให้ทำยทอยมาอยู่ด้านหน้าของช่องเชิงกราน



ข้อจำกัด : อยู่ในท่าได้ไม่นาน เพราะกางขาให้ฝ่าเท้าประกบกันองศาของขาที่กาง ทำให้เมื่อยลำ ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่ม





5.5 ทำนั่งยอง มีวิธีการจัดทำ โดยนั่งท่าที่ศีรษะและลำตัวอยู่ในแนวตั้งทำมุมกับพื้นราบ 60 – 90 องศา แยกขาออกจากกันประมาณช่วงไหล่ เท้าห่างกัน ประมาณ 30 – 45 cm. ก้นลอยเหนือพื้นทิ้งน้ำหนักตัวบนฝ่าเท้าทั้ง 2 ข้าง นั่งนาน 10 – 15 นาที

ข้อดี ; ลดเวลาในระยะมดลูกเปิดเร็วลดแรงกดบริเวณหลังและก้นกบถึงลดอาการปวดหลังส่วนล่างและลดอาการเจ็บครรภ์คลอด



ข้อจำกัด : อยู่ในท่าได้ไม่นาน เพราะ ผู้คลอดเกร็งหน้าขา เนื่องจากวางน้ำหนักลงที่ด้านหน้าเท้า , การนั่งยองขณะอยู่ระยะปากมดลูกเปิดเร็ว ซึ่งปกติผู้คลอดจะต้องอยู่บนเตียงอาจทำให้ยุ่งยากในการจัดทำ





**Thank
you**

