



การคลอด

สำหรับ


คุณแม่เตรียมคลอด

โดยห้องคลอด


รพ.เจ้าคุณไพฑูริย์พนมทวน

การคลอด

การคลอดลูกคือ กระบวนการทางธรรมชาติที่ร่างกายของสตรีตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทารกที่เจริญเติบโตอยู่ในครรภ์ออกมาสู่โลกภายนอก โดยปกติจะเกิดขึ้นเมื่อครบกำหนดตั้งครรภ์ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 36 - 42 สัปดาห์ กระบวนการนี้ประกอบด้วยหลายระยะ ซึ่งเริ่มจากการบีบรัดของมดลูกเพื่อให้ปากมดลูกเปิดออก และช่วยให้ทารกเคลื่อนตัวผ่านช่องคลอดจนกระทั่งคลอดออก



เจ็บครรภ์ คืออะไร



เจ็บครรภ์เป็นอาการปวดบริเวณท้องน้อยเกิดจาก
การหดตัวของมดลูก ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายกำลัง
เตรียมพร้อมสำหรับการคลอดลูก อาการเจ็บท้องคลอดจะ
ค่อย ๆ เพิ่มความถี่และความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งทารก
คลอดออกมา



เจ็บครรภ์คลอด

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

- เจ็บท้องเตือน : เป็นอาการปวดท้องน้อยแบบไม่สม่ำเสมอ อาจเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ อาการไม่รุนแรงนัก และสามารถบรรเทาได้ด้วยการพักผ่อน หรือการใช้ยาแก้ปวดทั่วไป
- เจ็บท้องจริง : เป็นอาการปวดท้องน้อยแบบสม่ำเสมอ อาการปวดจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ระยะห่างระหว่างการปวดแต่ละครั้งจะสั้นลง และอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น มีมูกเลือดออกจากช่องคลอด อาจรู้สึกปวดหลังร้าวลงมาที่ขา





ประเภทของการคลอดลูก

โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภท



1. การคลอดธรรมชาติ (Natural/Vaginal Delivery)

เป็นการคลอดทารกออกจากช่องคลอดตามกลไกธรรมชาติ แบ่งย่อยได้เป็น :

- คลอดธรรมชาติปกติ : แม่ตั้งครรภ์ครบกำหนดและคลอดเองตามกลไก
- คลอดธรรมชาติร่วมกับการใช้เครื่องมือช่วย : เช่น การใช้คีมหรือเครื่องดูดสุญญากาศช่วยในระบะแบ่งคลอด
- คลอดธรรมชาติแบบบล็อกล้างลดปวด (Painless Labor) : แพทย์จะฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังเพื่อลดความเจ็บปวด แต่คุณแม่ยังรู้สึกตัวและแบ่งคลอดได้เอง



2. การผ่าตัดคลอด (Cesarean Section / C-section)

เป็นการผ่าตัดนำทารกออกทางหน้าท้องและผนังมดลูก มักใช้ในกรณีที่คุณแม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้อย่างปลอดภัย หรือทารกอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสม



3. การคลอดในน้ำ (Water Birth)



เป็นการคลอดทางช่องคลอดที่แม่แช่ตัวอยู่ในอ่าง
น้ำอุ่นตลอดระยะเวลาการเจ็บครรภ์ และเบ่งคลอด ช่วย
ให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและลดความเจ็บปวด โดยเด็กจะ
ปรับตัวสู่สภาพแวดล้อมภายนอกอย่างนุ่มนวล การคลอด
ด้วยวิธีนี้ ภาวะครรภ์ของคุณแม่จะต้องได้รับการประเมิน
จากคุณหมอมว่ามีความเสี่ยงต่ำ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะ
ตั้งครรภ์ เป็นที่นิยมในต่างประเทศเป็นวิธีที่ง่ายสำหรับ
คุณแม่

กระบวนการคลอด

แบ่งออกเป็น 4 ระยะ

ระยะที่ 1 : ระยะการเจ็บครรภ์ ปากมดลูกเปิด

มดลูกจะเริ่มบีบตัวเป็นช่วง ๆ เพื่อให้ปากมดลูกเปิดออกกว้างขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถให้ทารกผ่านออกมาได้รู้สึกเจ็บปวดท้องน้อยและหลังปวดแบบบีบป่วนคล้ายประจำเดือน แต่รุนแรงกว่าซึ่งระยะที่ 1 ของการคลอดเป็นระยะที่ยาวนานที่สุดของการคลอด โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะย่อยคือ การคลอดระยะเริ่มต้นและการคลอดระยะกระตุ้นหรือเร่ง



- การคลอดระยะเริ่มต้น (early labor) ปากมดลูกจะเปิดน้อยกว่า 6 เซนติเมตรในระยะนี้ การบีบรัดมักจะไม่รุนแรงและอาจไม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระยะนี้อาจกินเวลาแตกต่างกัน ตั้งแต่ชั่วโมงไปจนถึงวัน
- การคลอดระยะกระตือรือร้น (active labor) ระยะนี้ปากมดลูกจะเปิดมากขึ้นตั้งแต่ 6 เซนติเมตรจนถึง 10 เซนติเมตร การบีบรัดจะรุนแรงขึ้นและถี่ขึ้น การคลอดระยะนี้มักกินเวลา 4 ถึง 8 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น

“ โภชนาที่ตั้งครรภ์ที่เพิ่งคลอดเป็นครั้งแรกจะใช้เวลาประมาณ 12-16 ชั่วโมง หญิงตั้งครรภ์ที่เคยผ่านการคลอดมาแล้วจะใช้เวลาประมาณ 6-12 ชั่วโมง ”



ระยะที่ 2: ระยะการคลอดลูก

เป็นระยะแบ่งคลอด ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปากมดลูกเปิดหมด
ถึงทารกคลอดออกมาภายนอก หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดครั้งแรกจะ
ใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ในขณะที่หญิงตั้งครรภ์ที่เคย
ผ่านการคลอดมาแล้วจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง



ระยะที่ 3 : ระยะการคลอดรก

โดยเริ่มตั้งแต่ทารกคลอดออกมาถึงรกคลอดออกมา
หมด ระยะนี้หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดครั้งแรก และที่ผ่าห
การคลอดมาแล้ว ใช้เวลาประมาณ 15 - 30 นาที



ระยะที่ 4 : ระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอด

ระยะนี้มดลูกยังมีการหดตัว ซึ่งส่งผล

ให้ไม่เสียเลือดหลังคลอด ปกติสามารถคลำมดลูก
ได้ทางหน้าท้อง ซึ่งจะอยู่ต่ำกว่าสะดือเล็กน้อย มี
ลักษณะกลมและแข็ง



ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับคุณแม่

- การเสียเลือดมาก ซึ่งอาจเกิดจากรกเกาะติดผนังมดลูกแน่น หรือมดลูกหดตัวไม่ดี
- ความดันโลหิตสูง อาจเกิดขึ้นหลังคลอด ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา
- การติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ หรือแผลผ่าตัด
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
- ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด เป็นภาวะทางอารมณ์ที่พบได้บ่อยในคุณแม่หลังคลอด



ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับลูก

- การขาดออกซิเจน อาจเกิดจากสายสะดือพันคอ หรือ ปัญหาในการคลอด
- ภาวะติดเชื้อ อาจได้รับเชื้อจากแม่ระหว่างคลอด
- ภาวะตัวเหลือง เกิดจากระดับบิลิรูบินในเลือดสูง
- ภาวะสมองพิการ อาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์หรือการคลอด



ขอบคุณ

