

Sea \mathcal{R} una función racional con dos variables, las integrales de la forma

$$\int \mathcal{R}(\sin(\theta), \cos(\theta)) d\theta$$

se racionalizan con el cambio de variable $t = \tan(\theta/2)$. Conocidas las identidades trigonométricas

$$\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1 - \cos(\theta)}{2}, \quad \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1 + \cos(\theta)}{2}, \quad \tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1 - \cos(\theta)}{1 + \cos(\theta)},$$

(¡las cuales tienen interés propio a la hora de integrar!), se deduce sencillamente que

$$1 + t^2 = \frac{2}{1 + \cos \theta}, \quad t = \frac{\sin(\theta)}{1 + \cos(\theta)}$$

y de éstas que

$$\sin(\theta) = \frac{2t}{1 + t^2}, \quad \cos(\theta) = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad d\theta = \frac{2dt}{1 + t^2},$$

es decir, *¡ambas funciones seno y coseno, así como el término asociado a la diferencial, son ahora funciones racionales!* de forma que, presumiblemente, la nueva integral será fácilmente resoluble pues adopta la forma:

$$\int \mathcal{R}(\sin(\theta), \cos(\theta)) d\theta = \int \mathcal{R}\left(\frac{2t}{1 + t^2}, \frac{1 - t^2}{1 + t^2}\right) \frac{2dt}{1 + t^2}$$

que será la de una integral de función racional, y que podemos resolver mediante su descomposición en fracciones parciales o mediante el método de Hermite.