


われて、シジミチョウなどが訪れます。ハナムグリの仲間もやってきて、花粉を運びます。木肌に^{かじ}齧った跡があったら、カミキリムシ(テッポウムシ)の仕業です。シロスジカミキリは樹皮を^{しわ}齧って穴を開けて産卵し、^ふ孵化した幼虫は樹皮下に食い込んで幹を食べます。3~4年で羽化し、5月頃に幹から出てきます。クスサンの幼虫は葉を食べ、^{まゆ}繭を作って蛹になります。その繭は透かし彫りのような網目構造になっているのでスカシダワラと呼ばれています。地面に落ちているので探してみてください。オトシブミが葉を巻き込んでいたら、中に卵が見つかります。

5 クワ


カイコを飼育する時にはクワの葉が必要です。クワの種類にマルベリーがありますが、実が大きく、たくさん収穫できます。どの種類にもヒトリガの幼虫が葉を食べに来ます。クワカミキリは幹に産卵し、樹木を食べて2年ほどで成虫になるので、枝が突然折れることがあります。またクワの木を食べるトラフカミキリの幼虫は6月~7月頃に多く発生し、その後は幹の中にいます。




イラガの幼虫



ハナムグリ



シロスジカミキリ



クスサンの幼虫



クワの実




クワカミキリ



温州ミカンの木



ヒトリガの幼虫



カイガラムシ

6 ミカン

うんしゅう

温州ミカンは高木にならないので、園庭に適していると思います。夏ミカンなどは高木になり、収穫が大変ですが、温州ミカンと一緒に植えると受粉率が高くなることもあるようです。花が咲くと受粉をする虫たちが訪れます。ミツバチ、マルハナバチ、アゲハは産卵しながら蜜も吸います。カメムシなども若い実を食べに来ます。葉にはカイガラムシが付きやすく、その排泄物で、すす病などに罹ることもあります。収穫量も減るので、手袋をして削ぎ落としてください。すす病に罹った葉は取り除き、殺菌剤を散布してください。

夏ミカンの収穫は12月頃に行い、乾燥しないようにして熟すのを待ち、翌年の5月頃に食べます。樹木で熟すのを待つこともできます。

ミカンの実の皮は漢方薬にもなります。園でも集めてみてください。ゴミではありません。

〔参考文献〕

瀬戸口明久著『害虫の誕生—虫からみた日本史』ちくま新書、2009年

中山周平著『野や庭の昆虫』小学館、2001年

続

園庭、散歩先で

生きもの、 植物との 付き合い方

小泉昭男

Akio KOIZUMI

小泉造園代表

元京都女子大学非常勤講師

果樹に来る昆虫

マルハナバチなどもやってくるので嬉しいのです。葉が変形していると、中にゾウムシの幼虫がいることがあるので、開けてみてください。葉が茂ると、ケムシの登場です。主に蛾の幼虫が来ることが多く、エグリバの仲間の幼虫が来ます。

3 カキ

主に甘柿^{あまがき}として富有柿^{ふゆうがき}があります。これは渋柿^{しぶがき}の突然変異でできたと言われています。江戸末期に岐阜県で発見されて、その後全国に広がったようです。園庭には甘柿と渋柿の2種類を植えることをオススメします。柿の葉にはタンニンが多く含まれ、殺菌効果がありますが、その葉を食べに来る昆虫もいます。イラガの幼虫に刺されると痛痒いので気をつけてください。刺されたら、大判の粘着テープで毛を取り除いて水で流し、ステロイド系の薬を湿布してください。毒は水溶性なので水で流すのがいいと思います。

4 クリ

花は5月頃から咲き始め、青臭い花の匂いに誘

前回も伝えましたが、ケムシを害虫というくくりで捉えないでください。京都市左京区にある小町寺（補陀洛寺）境内の掲示板に、「害虫という虫はいません。雑草という草はありません。人間が自分の都合でつけた名前です」という一文があります。その通りだと思います。生態系のつながりを見ると、今いる生きものがいなくなると未来の財産の一つ失うことにもなります。JT生命誌研究館名誉館長・中村桂子氏は「機械は部品があれば作れるけれど、1匹の虫は36億年かからないとできない」と言います。怖がることは拒めませんが、このことを思いながら接してほしいと思います。

1 ウメ

花は2月～3月にかけて咲きます。春、暖かくなると、虫たちも動き始めます。花粉を運ぶハナアブやミツバチなどです。寒さの時期に訪れる生きものは限られています。鳥のメジロなども蜜を吸いにやってきます。葉にはシャチホコガ、アメリカシロヒトリ、オビカレハなどの幼虫も訪れます。子どもが刺されると危険なイラガの幼虫などもやってくるので、要注意です。

2 リンゴ（ヒメリンゴ）

花は4月頃から咲き始め、実は9月～11月頃に熟します。リンゴは虫媒花で、虫は新芽、蕾、花、果実につきます。花粉を運ぶのは、主にハナアブの仲間です。ハナアブは人を刺すことはありません。怖がらずに観察してほしいです。ミツバチ、



ウメの木



ハナアブ



シャチホコガの幼虫



ニホンミツバチ