

Normalwerte: Urin

Test	Probe	Konventionelle Einheiten	SI-Einheiten
Aldosteron	Urin, 24 h	5–19 mcg/24 h	13,9–52,6 nmol/24 h
Aminosäuren, gesamt	Urin, 24 h	200–400 mg/24 h	14–29 nmol/24 h
Amylase	Urin, zeitspezifische Probe	6,5–48,1 U/h	—
Kalzium (uneingeschränkte Diät)	Urin, zeitspezifische Probe	100–300 mg/Tag	2,5–7,5 mmol/Tag
Katecholamine, gesamt	Urin, 24 h	< 100 mcg/m ² /24 h	< 591 nmol/m ² /24 h
Chlorid	Urin, zeitspezifische Probe	80–250 mEq/Tag	80–250 mmol/Tag
Kupfer	Urin, 24 h	0–100 mcg/24 h	0–1,6 mcmmol/24 h
Koproporphyrin	Urin, 24 h	50–250 mcg/24 h	76–382 nmol/24 h
Kortisol, freies	Urin, 24 h	< 90 mcg/24 h	< 248 nmol/24 h
Creatin			
• Frauen	Urin, 24 h	0–100 mg/24 h	0–763 mmol/24 h
• Männer	Urin, 24 h	4–40 mg/24 h	30–305 mmol/24 h
Kreatinin, gewichtsbezogen	Urin, 24 h	15–25 mg/kg/24 h	133–221 mmol/kg/24 h
D-Xylose-Ausscheidung 5 h nach der Einnahme von 25 g D-Xylose	Urin, 5-h-Sammlung	5–8 g	33–53 mmol
Estriol, Frauen	Urin, 24 h	> 12 mg/24 h	> 42 mcmmol/24 h
17-Hydroxycortikosteroide, fraktionierte, Erwachsene ≥ 18 Jahre:			
• Kortisol	Urin, 24 h	3,5–4,5 mcg/24 h	9,7–12,4 nmol/24 h
• Kortison	Urin, 24 h	17–129 mcg/24 h	47–359 nmol/24 h
5-Hydroxyindolessigsäure (5-HIAA)	Urin, 24 h	2–9 mg/24 h	10,4–46,8 mcmmol/24 h
17-Ketosteroid, fraktioniertes, Frauen > 12 Jahre:			
• Androsteron	Urin, 24 h	55–1589 mcg/24 h	—
• Pregnanetriol	Urin, 24 h	59–1391 mcg/24 h	—
17-Ketosteroid, fraktioniertes, Männer > 12 J.:			
• Androsteron	Urin, 24 h	234–2703 mcg/24 h	—
• Etiocholanolon	Urin, 24 h	151–3198 mcg/24 h	—

11-Ketoandrosteron	Urin, 24 h	4–33 mcg/24 h	—
• 11-Ketoetiocholanolon	Urin, 24 h	51–1016 mcg/24 h	—
• Pregnanetriol	Urin, 24 h	245–1701 mcg/24 h	—
Metanephrine, fraktionierte, normotensive Patienten ≥ 18 Jahre:			
• Frauen, Metanephrin	Urin, 24 h	30–180 mcg/24 h	—
• Frauen, Metanephrene gesamt	Urin, 24 h	142–510 mcg/24 h	—
• Männer, Metanephrin	Urin, 24 h	44–261 mcg/24 h	—
• Männer, Metanephrene gesamt	Urin, 24 h	190–583 mcg/24 h	—
Metanephrine, fraktionierte, normotensive Männern und Frauen im Alter von 18–29 Jahren:			
• Normetanephrin	Urin, 24 h	103–390 mcg/24 h	—
Metanephrine, fraktionierte, hypertensive Männer und Frauen:			
• Metanephrin	Urin, 24 h	< 400 mcg/24 h	—
• Normetanephrin	Urin, 24 h	< 900 mcg/24 h	—
• Metanephrene gesamt	Urin, 24 h	< 1300 mcg/24 h	—
Mikroalbumin	Urin, 24 h	< 30 mg/24 h	—
Mikroalbumin, Albumin-Kreatinin-Verhältnis	Urin, zufällige Probe	< 20 mcg/mg	—
Osmolalität	Urin, zufällige Probe	38–1400 mOsm/kg H ₂ O	—
Oxalat	Urin, 24 h	0,11–0,46 mmol/Probe*	—
Phosphat, tubuläre Reabsorption	Urin, zufällige Probe	79–94% der Filtrationsrate	—
Porphobilinogene	Urin, zufällige Probe	0–0,5 mg/g Kreatinin	—
Kalium	Urin, 24 h	25–100 mEq/24 h	25–100 mmol/24 h
Protein, gesamt	Urin, 24 h	< 100 mg/24 h	—
Natrium	Urin, 24 h	100–260 mEq/24 h	100–260 mmol/24 h
Harnsäure	Urin, 24 h	250–750 mg/24 h	1,48–4,43 mmol/24 h

Urinuntersuchung, Routine^T

• pH	Urin, zufällige Probe	5–7	—
---------	-----------------------	-----	---

Urinuntersuchung, Routine, Teststreifen[†]:

• Bilirubin	Urin, zufällige Probe	Negativ	—
• Blut	Urin, zufällige Probe	Negativ	—
• Glukose	Urin, zufällige Probe	Negativ	—
• Ketone	Urin, zufällige Probe	Negativ	—
• Leukozytenesterase	Urin, zufällige Probe	Negativ	—
• Nitrite	Urin, zufällige Probe	Negativ	—
• Protein	Urin, zufällige Probe	Negativ	—
• Urobilinogen	Urin, zufällige Probe	0,2–1,0 EU	—
Urobilinogen	Urin, 24 h	0,05–2,5 mg/24 h	0,08–4,22 mmol/24 h
Vanillinmandelsäure (VMA)	Urin, 24 h	< 8 mg/24 h	< 40,4 mmol/24 h

* Der Wert basiert auf einer Sammlung über 24 Stunden.

[†] Normalbefunde, die durch mikroskopische Untersuchung festgestellt wurden, können einige Erythrozyten (vor allem bei menstruierenden Frauen), Leukozyten, Epithelzellen, Bakterien, Hefezellen, Kristalle (z. B. Kalziumoxalat, Triphosphat, amorphe Phosphate und Urate), Sperma und nicht identifizierbare Materialien umfassen. Große Mengen dieser Stoffe oder das Vorhandensein von bestimmten anderen Materialien können anomal sein.

EU = Ehrlich-Einheiten.