

ثانوية الشهيد حميدي عيسى - أولاد دراج - المسيلة

يسرني أن أتقدم لكم بهذا العمل المتواضع والمتمثل في
مذكرات مادة الرياضيات لسنة ثانية ثانوي شعبة:

★ آداب وفلسفة ★ لغات أجنبية ★

يتضمن هذه العمل:

- مذكرة 13: العدد المشتق.
- مذكرة 14: الدالة المشتقة لدالة.
- مذكرة 15: العمليات على المشتقات.
- مذكرة 16: الدالة المشتقة اتجاه التغير.
- مذكرة 17: التمثيل البياني لثلاثي الحدود من الدرجة الثانية.
- مذكرة 18: جذور ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية.



لا تنسونا من صالح الدعاء للوالدين الكريمين ولي. محبكم في الله الأستاذ: فراحتية المحفوظ



السنة الدراسية: 2022 / 2023

آخر تحديث: 2022 / 12 / 23

↓ للتواصل معنا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ↓

المكتسبات القبلية: دراسة الدوال العددية.

الكفاءات المستهدفة: القدرة على حساب نهاية دالة عند 0 وحساب نهاية نسبة التزايد لإيجاد العدد المشتق.

الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل																												
15 د	نشاط مقترح : لنكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x^2 + 2$ ① احسب صور الأعداد -0.0001 ، -0.01 ، 0 ، 0.0001 ، 0.01 ② لما يقترب x من 0 إلى أين تقترب (تؤول) $f(x)$. ③ احسب مايلي: $f(3)$ ، $f(h)$ و $f(3+h)$ حيث h عدد حقيقي غير معدوم. ④ بين أن: $\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = h + 6$ ⑤ اكمل الجدول التالي: <table border="1"> <tr> <th>h</th> <td>-0.1</td> <td>-0.01</td> <td>-0.001</td> <td>0.001</td> <td>0.01</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <th>$\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> ⑥ إلى أين تؤول النسبة $\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$ عندما يأخذ h قيما أقرب فأقرب من العدد 0. مناقشة النشاط : ① حساب صور الأعداد: $f(0.0001) = (0.0001)^2 + 2 = 2.00000001$ • $f(0.01) = (0.01)^2 + 2 = 2.0001$ • $f(-0.01) = (-0.01)^2 + 2 = 2.0001$ • $f(0) = (0)^2 + 2 = 2$ • $f(-0.0001) = (-0.0001)^2 + 2 = 2.00000001$ • ② لما يقترب x من 0 تقترب (تؤول) $f(x)$ إلى 2 ونكتب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$ ③ حساب الصور: $f(3+h) = h^2 + 6h + 11$ • $f(h) = h^2 + 2$ • $f(3) = 11$ • ④ تبين أن: $\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = h + 6$ • لدينا: $\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{h^2 + 2h + 3 - 3}{h} = \frac{h(h+2)}{h} = h + 2$ ⑤ اكمل الجدول التالي: <table border="1"> <tr> <th>h</th> <td>-0.1</td> <td>-0.01</td> <td>-0.001</td> <td>0.001</td> <td>0.01</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <th>$\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$</th> <td>5.9</td> <td>5.99</td> <td>5.999</td> <td>6.001</td> <td>6.01</td> <td>6.1</td> </tr> </table> ⑥ تؤول النسبة $\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$ عندما يأخذ h قيما أقرب فأقرب من العدد 0 إلى 6 ونكتب $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = 6$ ونسميه العدد المشتق للدالة f عند 3 ونرمز له بـ $f'(3)$. النهاية عند 0 : نقبل أن: إذا كانت الدالة f معرفة على مجال I يمل العدد 0 فإن حساب نهاية f عند 0 يؤول إلى حساب $f(0)$ ونقرأ: نهاية $f(x)$ عندما يؤول x إلى 0 تساوي $f(0)$ ونكتب: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$	h	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1	$\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$							h	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1	$\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$	5.9	5.99	5.999	6.001	6.01	6.1	مرحلة الإنطلاق التشخيص والاكتشاف بناء المعارف
h	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1																								
$\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$																														
h	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1																								
$\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$	5.9	5.99	5.999	6.001	6.01	6.1																								

مثال - 1 -

- ✓ لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x^2 + 5x + 1$
- ✓ f معرفة على $\mathbb{R}$ وبالتالي f معرفة عند العدد 0 و $f(0) = 1$
- ✓ عندما يؤول x إلى العدد 0 فإن $f(x)$ تؤول إلى 1. إذن $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 1$

نسبة تزايد دالة بين عددين حقيقيين :

تعريف

a و b عددان حقيقيان من المجال I ، نسبة تزايد الدالة f بين العددين a و b هي : $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

التفسير البياني :

النسبة : $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ هي معامل توجيه المستقيم (AB) القاطع للمنحنى (C_f) حيث : $A(a, f(a))$ و $B(b, f(b))$ نقطتان من المنحنى (C_f)

بوضع $b = a + h$ يكون $b - a = h$ فإن نسبة التزايد يكتب على الشكل : $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$

الدالة القابلة للإشتقاق عند عدد (العدد المشتق) :

مبرهنة وتعريف


نقول ان الدالة f قابلة للإشتقاق عند a معناه أن نهاية النسبة $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ لما h تؤول إلى 0 تساوي عدد حقيقي.

ن نهاية هذه النسبة إن وجدت، تسمى العدد المشتق للدالة f عند العدد a ويرمز له بالرمز $f'(a)$

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \text{ ونكتب}$$

ملاحظة :

❖ إذا كانت نهاية النسبة $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ لما h يؤول إلى 0 غير منتهية ($+\infty$ أو $-\infty$) فإن الدالة f غير قابلة للإشتقاق عند a .



تطبيق

(I) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = 4x - 6$

① عين نسبة تزايد الدالة f بين العددين 2 و $2+h$

② استنتج أن الدالة f تقبل الإشتقاق عند 2 وعين $f'(2)$

③ هل الدالة f تقبل الإشتقاق عند 0 ؟

(II) نفس الأسئلة بالنسبة للدالة g المعرفة على $\mathbb{R} - \{0\}$ كما يلي : $g(x) = \frac{1}{x}$

التفسير الهندسي للعدد المشتق (معادلة المماس) :


تعريف

نقول ان الدالة f معرفة على مجال I . المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى معلم $(o, \vec{i}, \vec{j})$ نسمي مماسا للمنحنى (C_f) عند نقطة A فاصلتها (a) المستقيم الذي يشمل A ومعامل توجيهه العدد المشتق للدالة f عند a بحيث معادلة المماس تعطى بالشكل :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$



15 د




ملاحظة :

- ❖ المماس (T) يشترك مع المنحنى (Cf) في النقطة A
- ❖ إذا كان $f'(a) = 0$ فإن معادلة المماس (T) تكتب $y = f(a)$. وفي هذه الحالة، المماس (T) يوازي محور الفواصل.

مثال - 2 -

- f هي الدالة مربع و (Cf) المنحنى الممثل للدالة f في المستوى المنسوب إلى معلم $(o, \vec{i}, \vec{j})$
- ✓ الدالة f قابلة للاشتقاق عند 1 و $f'(1) = 2$
- ✓ معادلة المماس (T) للمنحنى (Cf) عند النقطة ذات الفاصلة 1 هي : $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$
- حيث $f(1) = 1$ إذن المعادلة المختصرة للمماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 1 هي : $y = 2x - 1$



تطبيق

تمرين 22 صفحة 191

عمل منزلي

تمارين 2 - 5 - 6 - 7 - 9 - 13 - 14 - 15 الصفحة 188 - 189 - 180

تمارين 20 - 21 - 23 - 24 - 27 - 28 الصفحة 191 - 192

ملاحظات حول سير الحصة :

- المكتسبات القبلية: دراسة الدوال العددية. حساب نهاية عند 0. العدد المشتق.
الكفاءات المستهدفة: تعيين الدوال المشتقة للدوال المرجعية.
الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
10 د	★ نشاط مقترح : (يقسم حسب تسلسل الدرس) بين أن الدالة f دالة قابلة للاشتقاق على مجال I معيننا دالتها المشتقة في كل حالة مما يلي: ① $f(x) = ax + b$ و $a \in \mathbb{R}$ و $b \in \mathbb{R}$ و $I = \mathbb{R}$ ② $f(x) = x^2$ و $I = \mathbb{R}$ ③ $f(x) = \frac{1}{x}$ و $x_0 \in \mathbb{R}^*$ مناقشة النشاط : ① ليكن $x_0 \in \mathbb{R}$ و $h \neq 0$ لدينا: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a(x_0 + h) + b - ax_0 - b}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ah}{h} = a$ وعليه f تقبل الاشتقاق عند كل x_0 من $\mathbb{R}$ ولدينا: $f'(x_0) = a$ ② ليكن $x_0 \in \mathbb{R}$ و $h \neq 0$ لدينا: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x_0 + h)^2 - x_0^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 2x_0h}{h} = 2x_0$ وعليه f تقبل الاشتقاق عند كل x_0 من $\mathbb{R}$ ولدينا: $f'(x_0) = 2x_0$ ③ ليكن $x_0 \in \mathbb{R}^*$ و $h \neq 0$ لدينا: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x_0 + h} - \frac{1}{x_0}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{x_0h(x_0 + h)} = -\frac{1}{x_0^2}$ وعليه f تقبل الاشتقاق عند كل x_0 من $\mathbb{R}^*$ ولدينا: $f'(x_0) = -\frac{1}{x_0^2}$ قابلية الاشتقاق لدالة على مجال : مبرهنة f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$. • نقول أن الدالة f قابلة للاشتقاق على I إذا وفقط إذا كانت قابلة للاشتقاق عند كل عدد x من I • إذا كانت الدالة f قابلة للاشتقاق على المجال I فإن العدد المشتق للدالة f عند كل عدد حقيقي x من I موجود. الدالة المشتقة لدالة : مبرهنة f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$. • إن الدالة التي ترفق بكل عدد x من I العدد المشتق $f'(x)$ تسمى الدالة المشتقة للدالة f على I ويرمز لها بالرمز: f'. ونكتب $f' : x \mapsto f'(x)$	مرحلة الإنطلاق التشخيص والاكتشاف بناء المعارف
10 د		
10 د		

ملحظة :

❖ نذكر أن الدالة $f'(x)$ معرفة كما يلي : $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ و h عدد حقيقي غير معدوم

مثال - 1 -

✓ $f(x) = 2x + 7$ هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي :
 x عدد حقيقي ، العدد المشتق للدالة f عند x هو $f'(x)$ حيث :

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(x+h) - 3x}{h} = 3$$

 ✓ إذن الدالة المشتقة $f'(x)$ للدالة f هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f'(x) = 3$

الدوال المشتقة لدوال مألوفة :

نعتبر الدالة f قابلة للاشتقاق على مجموعة تعريفها في كل حالة من الحالات الموالية:

الدالة المشتقة للدالة f حيث $f(x) = k$:

مبرهنة

k عدد حقيقي. الدالة f حيث $f(x) = k$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي :
 $f'(x) = 0$. معناه أن الدالة المشتقة لدالة ثابتة هي الدالة المنعدمة.

الدالة المشتقة لدالة تألفية :

مبرهنة

الدالة f حيث $f(x) = ax + b$ ، a و b عدنان حقيقيان قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f'(x) = a$.

حالة خاصة :

الدالة المشتقة للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = x$ هي الدالة f' المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f'(x) = 1$



تطبيق

عين الدوال المشتقة للدوال التالية :

$$f(x) = -7x + 1441 \text{ ①} \quad g(x) = 6x \text{ ②} \quad h(x) = -2019 \text{ ③}$$

الدالة المشتقة للدالة « مربع » :

مبرهنة

الدالة f حيث $f(x) = x^2$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f'(x) = 2x$.

الدالة المشتقة للدالة « مكعب » :

مبرهنة

الدالة f حيث $f(x) = x^3$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f'(x) = 3x^2$.

الدالة المشتقة للدالة f حيث $f(x) = x^n$ و n عدد طبيعي أكبر تماما من 1 :

مبرهنة

الدالة f حيث $f(x) = x^n$ و n عدد طبيعي أكبر تماما من 1 قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f'(x) = nx^{n-1}$.

مثال - 2 -

✓ الدالة المشتقة للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = x^9$
✓ هي الدالة f' المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f'(x) = 9x^8$

الدالة المشتقة للدالة « مقلوب » :

مبرهنة

الدالة f المعرفة كما يلي $f(x) = \frac{1}{x}$ قابلة للإشتقاق على كل من المجالين $]-\infty, 0[$ و $]0, +\infty[$ ودالتها المشتقة f' معرفة كما يلي : $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

جدول يلخص مشتقات الدوال المألوفة :

نعتبر الدالة f قابلة للإشتقاق على مجموعة تعريفها في كل حالة من الحالات الموالية:

جدول ملخص		
الدالة المشتقة f'	مجالات قابلية الإشتقاق	الدالة f
$f'(x) = 0$	$\mathbb{R}$	$f(x) = k$ حيث k عدد حقيقي
$f'(x) = 1$	$\mathbb{R}$	$f(x) = x$
$f'(x) = a$	$\mathbb{R}$	$f(x) = ax + b$ حيث a و b عددا حقيقيان
$f'(x) = 2x$	$\mathbb{R}$	$f(x) = x^2$
$f'(x) = 3x^2$	$\mathbb{R}$	$f(x) = x^3$
$x \mapsto nx^{n-1}$	$\mathbb{R}$	$f(x) = x^n$ حيث $n \in \mathbb{N}$ و $n > 1$
$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$	$]0, +\infty[$ و $]-\infty, 0[$	$f(x) = \frac{1}{x}$

عمل منزلي

تمارين 31 - 32 الصفحة 193

ملاحظات حول سير الحصة :

- المكتسبات القبلية: دراسة الدوال العددية، قابلية الاشتقاق لدالة، الدالة المشتقة لدالة.
الكفاءات المستهدفة: معرفة مشتق مجموع دالتين، مشتق جداء دالتين، مشتق مقلوب دالة، مشتق حاصل قسمة دالتين.
الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
15 د	★ نشاط مقترح : (يقسم حسب تسلسل الدرس) نعتبر الدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x + 1$ و $g(x) = x - 2$. 1. أحسب وبسط كلا مما يلي: $f(x) + g(x)$ و $f(x) \times g(x)$. 2. * أحسب وبسط كلا مما يلي: $f'(x) + g'(x)$ ، $(f + g)'(x)$ ، $(f \times g)'(x)$ و $f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$. * ماذا تستنتج؟ 3. * بين أنه من أجل $x \in \mathbb{R} - \{2\}$ فإن: $\frac{f(x)}{g(x)} = 1 + \frac{3}{x-2}$. * أحسب $\left(\frac{f}{g}\right)'(x)$ و $\frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{[g(x)]^2}$. ماذا تستنتج؟ العمليات على الدوال المشتقة : (مبرهات) f ، g دالتان معرفتان على نفس المجال المفتوح I من $\mathbb{R}$ ، k عدد حقيقي. مشتقة مجموع دالتين : مبرهنة 01 إذا كانت الدالتان f و g قابلتين للاشتقاق على المجال I فإن الدالة $(f + g)$ قابلة للاشتقاق على I ودالتها المشتقة $(f + g)'$ معرفة كما يلي: من أجل كل عدد حقيقي x من I ، $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$. مثال - 1 - الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{0\}$ بـ $f(x) = \frac{1}{x} + x^2$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R} - \{0\}$ ودالتها المشتقة f' حيث: $f'(x) = \left(\frac{1}{x}\right)' + (x^2)' = -\frac{1}{x^2} + 2x$ مشتقة جداء دالتين : مبرهنة 02 إذا كانت الدالتان f و g قابلتين للاشتقاق على المجال I فإن الدالة $(f \times g)$ قابلة للاشتقاق على I ودالتها المشتقة $(f \times g)'$ معرفة على I كما يلي: $(f \times g)'(x) = f'(x) \times g(x) + g'(x) \times f(x)$. مثال - 2 - الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = (3x - 2)x^2$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' حيث: $f'(x) = (3x - 2)'(x^2) + (x^2)'(3x - 2) = 3x^2 + 2x(3x - 2)$	مرحلة الإنطلاق التشخيص والإكتشاف بناء معارف
15 د		
15 د		

حالات خاصة :

- ❖ إذا كانت f قابلة للاشتقاق على I فإن الدالة f^2 قابلة للاشتقاق على I ودالتها المشتقة $(f^2)'$ معرفة على I كما يلي: $(f^2)'(x) = 2f(x)f'(x)$.
- ❖ إذا كانت f قابلة للاشتقاق على I فإن الدالة kf قابلة للاشتقاق على I ودالتها المشتقة $(kf)'$ معرفة على I كما يلي: $(kf)'(x) = kf'(x)$ (حيث k عدد حقيقي).

مثال - 3 -

- ✓ الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = (5x - 2)^2$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' حيث: $f'(x) = 2(5x - 2)(5x - 2)' = 10(5x - 2)$.
- ✓ الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $g(x) = 4(x^2 - 6)$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة g' حيث: $g'(x) = 4(x^2 - 6)' = 8x$.

مشتقة مقلوب دالة :

مبرهنة 03

- ✍ إذا كانت الدالة f قابلة للاشتقاق على المجال I حيث من أجل كل عدد حقيقي x من I ، $f(x) \neq 0$ فإن الدالة $\left(\frac{1}{f}\right)$ قابلة للاشتقاق على I ودالتها المشتقة $\left(\frac{1}{f}\right)'$ معرفة كما يلي:
- من أجل كل عدد حقيقي x من I حيث $f(x) \neq 0$ ، $\left(\frac{1}{f}\right)'(x) = -\frac{f'(x)}{[f(x)]^2}$.

مثال - 4 -

- الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ $f(x) = \frac{1}{3x - 3}$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R} - \{1\}$ ودالتها المشتقة f' حيث: $f'(x) = -\frac{(3x - 3)'}{(3x - 3)^2} = -\frac{3}{(3x - 3)^2}$.

مشتقة حاصل قسمة دالتين :

مبرهنة 04

- ✍ إذا كانت الدالتان f و g قابلتين للاشتقاق على المجال I حيث من أجل كل عدد حقيقي x من I ، $g(x) \neq 0$ فإن الدالة $\left(\frac{f}{g}\right)$ قابلة للاشتقاق على I ودالتها المشتقة $\left(\frac{f}{g}\right)'$ معرفة كما يلي:
- من أجل كل عدد حقيقي x من I حيث $g(x) \neq 0$ ، $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{[g(x)]^2}$.

مثال - 5 -

- الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بـ $f(x) = \frac{x^2 + 1}{3x - 6}$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R} - \{2\}$ ودالتها المشتقة f' حيث: $f'(x) = \frac{(x^2 + 1)'(3x - 6) - (3x - 6)'(x^2 + 1)}{(3x - 6)^2} = \frac{2x(3x - 6) - 3(x^2 + 1)}{(3x - 6)^2}$.
- أي: $f'(x) = \frac{3x^2 - 12x - 3}{(3x - 6)^2}$.



15 د



15 د



15 د

جدول يلخص العمليات على الدوال المشتقة :

f و g دالتان قابلتان للإشتقاق على المجال I من $\mathbb{R}$ ، k عدد حقيقي.

جدول ملخص		
الدالة	قابلية الإشتقاق على	ودالتها المشتقة هي
$f + g$	I	$f' + g'$
$f - g$	I	$f' - g'$
$f \cdot g$	I	$f' \cdot g + g' \cdot f$
$k \cdot f$	I	$k \cdot f'$
f^2	I	$2 \cdot f \cdot f'$
$\frac{1}{f}$	I بإستثناء قيم x حيث $f(x) \neq 0$	$-\frac{f'}{f^2}$
$\frac{f}{g}$	I بإستثناء قيم x حيث $g(x) \neq 0$	$\frac{f' \cdot g - g' \cdot f}{g^2}$



تطبيق

باستعمال النظريات على المشتقات، أحسب الدالة المشتقة للدالة f في كل حالة مما يلي:

$$\begin{aligned} f(x) = x^2 - 5x + 10 & \text{ ①} & f(x) = \frac{3}{2x-5} & \text{ ②} & f(x) = \frac{3x-1}{5x+2} & \text{ ③} \\ f(x) = (7x-15)(12-4x) & \text{ ④} & f(x) = -10(6-4x) & \text{ ⑤} & f(x) = (9x+12)^2 & \text{ ⑥} \end{aligned}$$

عمل منزلي

تمارين 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 40 الصفحة 193 - 194

ملاحظات حول سير الحصة :

بناء معارف

التقويم

المكتسبات القبلية: دراسة الدوال العددية، الدالة المشتقة لدالة، العمليات على الدوال المشتقة.

الكفاءات المستهدفة: الربط بين إشارة المشتقة واتجاه تغير دالة على مجال.

الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصر الدرس	المدة																																								
مرحلة الإنطلاق	نشاط مقترح : نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي: $f(x) = x^2 - 2x + 1$. 1. أكمل الجدول الآتي، ثم أنشئ (C_f) التمثيل البياني للدالة f. <table><tr><td>x</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 2. انجز جدول تغيرات الدالة f. 3. عين الدالة f' الدالة المشتقة للدالة f. 4. شكل جدول إشارة الدالة f'. 5. هل توجد علاقة تربط بين إشارة الدالة f' واتجاه تغير الدالة f. مناقشة النشاط : 1. إكمال الجدول: <table><tr><td>x</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr></table> • إنشاء (C_f): 2. جدول تغيرات الدالة f: <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>1</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td></td><td>0</td><td></td></tr></table> 3. عبارة الدالة f': الدالة f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ولدينا: $f'(x) = 2x - 2$ 4. جدول إشارة الدالة f': لدينا $f'(x) = 0$ ومنه $2x - 2 = 0$ إذن $x = 1$ <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>1</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table> <td>15 د</td>	x	-1	0	1	2	3	$f(x)$						x	-1	0	1	2	3	$f(x)$	4	1	0	1	4	x	$-\infty$	1	$+\infty$	$f(x)$		0		x	$-\infty$	1	$+\infty$	$f'(x)$	-	0	+	15 د
x	-1	0	1	2	3																																					
$f(x)$																																										
x	-1	0	1	2	3																																					
$f(x)$	4	1	0	1	4																																					
x	$-\infty$	1	$+\infty$																																							
$f(x)$		0																																								
x	$-\infty$	1	$+\infty$																																							
$f'(x)$	-	0	+																																							
التشخيص والاكتشاف																																										

5. نعم توجد علاقة بين إشارة الدالة f' واتجاه تغير الدالة f .

★ الدالة f' سالبة تماما على المجال $]-\infty; 1]$ والدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty; 1]$.

★ الدالة f' موجبة تماما على المجال $[1; +\infty[$ والدالة f متزايدة تماما على المجال $[1; +\infty[$.

الدالة المشتقة وإتجاه التغير :

f دالة معرفة وقابلة للإشتقاق على مجال I و f' دالتها المشتقة:

مبرهنة (تقبل بدون برهان)

أ) إذا كانت f' موجبة تماما $(f'(x) \geq 0)$ على المجال I فإن الدالة f متزايدة تماما على المجال I

ب) إذا كانت f' سالبة تماما $(f'(x) \leq 0)$ على المجال I فإن الدالة f متناقصة تماما على المجال I

ج) إذا كانت f' معدومة $(f'(x) = 0)$ على المجال I فإن الدالة f ثابتة على المجال I

ملاحظة :

❖ يبقى النصان أ) و ب) في المبرهنة السابقة صحيحين عندما ينعدم $f'(x)$ من أجل عدد منته من قيم x .

مثال - 1 -

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = 3x^2 - 12x$

✓ f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ومن أجل كل x من $\mathbb{R}$ لدينا: $f'(x) = 6x - 12$

✓ إشارة f' ملخصة في جدول التالي:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+

✓ ومنه نستنتج أن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty; 2]$ ومتزايدة تماما على المجال $[2; +\infty[$

✓ جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$		-12	



تطبيق

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = -4x^2 - 16x + 2$

① عين الدالة المشتقة f' للدالة f .

② ادرس إتجاه تغير الدالة f .

③ انجز جدول تغيرات الدالة f .

تمارين 42 ← 50 الصفحة 195 - 196

عمل منزلي



ملاحظات حول سير الحصة :

التمثيل البياني لدالة ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية :

مبرهنة



15 د

في معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$ للمستوي، التمثيل البياني لثلاثي حدود من الدرجة الثانية f حيث: $f(x) = ax^2 + bx + c$ (مع $a \neq 0$) هو **قطع مكافئ**، ذروته النقطة M ذات الإحداثيات $x = -\frac{b}{2a}$ ومحور تناظره المستقيم الذي معادلته: $x = -\frac{b}{2a}$


ملاحظة :

جهة انفرج القطع المكافئ تتعلق بإشارة a .
 ❖ إذا كان $a > 0$ فيكون القطع المكافئ منفرجا نحو الأعلى.
 ❖ إذا كان $a < 0$ فيكون القطع المكافئ منفرجا نحو الأسفل.

مثال - 2 -



15 د



❖ التمثيل البياني للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:
 $f(x) = 2x^2 + 4x - 1$ هو القطع المكافئ (C_f)
 الذي ذروته $S(-1; -3)$.
 بما أن $a = 2$ موجب، فإن (C_f) منفرج نحو الأعلى.

❖ التمثيل البياني للدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:
 $f(x) = -3x^2 + 12x - 11$ هو القطع المكافئ (C_g)
 الذي ذروته $S(2; 1)$.
 بما أن $a = -3$ سالب، فإن (C_g) منفرج نحو الأسفل.

المعادلات من الدرجة الثانية :

تعريف



15 د

نسمي معادلة من الدرجة الثانية، ذات المجهول x ، هي كل معادلة يمكن كتابتها على الشكل:
 $ax^2 + bx + c = 0$ حيث a, b, c أعداد حقيقية ثابتة مع $a \neq 0$.

مثال - 3 -

✓ كل من المعادلات: $3x^2 = 0$ $4x^2 + 5x - 3 = 0$ $(x+4)(x-3) = 0$
 هي معادلات من الدرجة الثانية ذات المجهول الحقيقي x .

حل معادلة من الدرجة الثانية بيانيا :

طريقة



15 د

لحل معادلة من الدرجة الثانية بيانيا نعتمد على التمثيل البياني لدالة ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية.
 بفرض f دالة ثلاثي حدود من الدرجة الثانية معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = ax^2 + bx + c$ حيث a, b, c أعداد حقيقية و $a \neq 0$. وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$ للمستوي.
 ❖ إذا كان (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطتين مختلفتين فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين مختلفين هما فواصل هذه النقطتين.
 ❖ إذا كان (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا هو فاصلة هذه النقطة.
 ❖ إذا كان (C_f) لا يقطع محور الفواصل فإن المعادلة $f(x) = 0$ لا تقبل حلول.



20 د



تطبيق

التقويم

حل بيانيا في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية :

$$x^2 = -x + 6 \quad (3)$$

$$x^2 - 4x = -1 \quad (2)$$

$$x^2 + x + 1 = 0 \quad (1)$$



عمل منزلي



تمارين 9 - 10 - 12 - 13 - 14 الصفحة 136

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

المكتسبات القبلية: دراسة الدوال العددية.

الكفاءات المستهدفة: تحديد جذور ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية وإشارته اعتمادا على: • الشكل النموذجي. • المميز • العبارة المحللة.

الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
15 د	مناقشة النشاط 04 صفحة 116 : الأشكال المختلفة لدالة ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية :	مرحلة الإنطلاق
15 د	نعتبر f دالة ثلاثي حدود من الدرجة الثانية. ❖ يمكن أن يكتب على الشكل $f(x) = ax^2 + bx + c$ حيث a, b, c أعداد حقيقية ثابتة و $a \neq 0$ ونسميه الشكل المختصر له. ❖ يمكن أن يكتب على الشكل $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ حيث x_1 و x_2 جذور له، ونسميه الشكل المحلل له. ❖ يمكن أن يكتب على الشكل النموذجي له. الشكل النموذجي لثلاثي الحدود من الدرجة الثانية :	
	مبرهنة وتعريف من أجل كل عدد حقيقي x ، $ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right]$ مع $a \neq 0$. نسمي الكتابة $f(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right]$ الشكل النموذجي لثلاثي الحدود.	
	برهان. من أجل كل عدد حقيقي x لدينا : $f(x) = ax^2 + bx + c = a \left[x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right] = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{c}{a} - \frac{b^2}{4a^2} \right]$ $= a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2} \right] = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right]$ □	
15 د	ملاحظة : ❖ بوضع $\alpha = \frac{b}{2a}$ و $\beta = -\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$ ، نكتب $ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)^2 + \beta$	
	مثال - 1 - $2x^2 - 12x + 13 = 2 \left(x^2 - 6x + \frac{13}{2} \right) = 2 \left((x - 3)^2 - 9 + \frac{13}{2} \right) = 2(x - 3)^2 - 5$ ✓ $-3x^2 + 6x + 1 = -3 \left(x^2 - 2x - \frac{1}{3} \right) = -3 \left((x - 1)^2 - 1 - \frac{1}{3} \right) = -3(x - 1)^2 + 4$ ✓	
15 د	مميز ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية : تعريف نسمي مميز ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية $ax^2 + bx + c$ العدد الحقيقي Δ حيث: $\Delta = b^2 - 4ac$.	

حل معادلة من الدرجة الثانية جبريا :

مبرهنة

لتكن المعادلة من الدرجة الثانية ذات المجهول x التالية: $ax^2 + bx + c = 0$ حيث $a \neq 0$ و b, c أعداد حقيقية ثابتة مع $a \neq 0$.

إن حل المعادلة يعتمد على حساب المميز $\Delta = b^2 - 4ac$ ويكون في ثلاث حالات :

① الحالة الأولى $\Delta > 0$

إذا كان $\Delta > 0$ المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ تقبل حلين مختلفين x_1 و x_2

$$\text{حيث : } x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ و } x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

والمعادلة تقبل تحليلًا هو : $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) = 0$

ومجموعة الحلول هي : $S = \{x_1, x_2\}$

② الحالة الثانية $\Delta = 0$

إذا كان $\Delta = 0$ المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ تقبل حلاً مضاعفاً حيث : $x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$

والمعادلة تقبل تحليلًا هو : $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)^2 = 0$ ومجموعة الحلول هي : $S = \left\{ \frac{-b}{2a} \right\}$

③ الحالة الثالثة $\Delta < 0$

إذا كان $\Delta < 0$ المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ لا تقبل حلولاً ولا تقبل تحليلًا ومجموعة الحلول هي : $S = \emptyset$

ملاحظة :

❖ حل المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ مع $(a \neq 0)$ يسما أيضا **جذرا** ثلاثي الحدود $ax^2 + bx + c$.

تغيرات دالة ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية :

$f(x) = ax^2 + bx + c$ دالة ثلاثي حدود من الدرجة الثانية حيث $f'(x) = 2ax + b$ دالتها المشتقة f' حيث $f'(x) = 2ax + b$ دراسة إشارة المشتقة

$$f'(x) = 0 \text{ معناه } 2ax + b = 0 \text{ ومنه } x = -\frac{b}{2a}$$

جدول إشارة المشتقة و جدول تغيرات الدالة

حالة $a < 0$			
x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$f\left(-\frac{b}{2a}\right)$		

حالة $a > 0$			
x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$f\left(-\frac{b}{2a}\right)$		



تطبيق

❖ حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

$$\textcircled{1} x^2 + x + 1 = 0 \quad \textcircled{2} x^2 - 4x = -1 \quad \textcircled{3} x^2 = -x + 6$$

❖ ادرس تغيرات الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = 2x^2 - 12x + 13$.

عمل منزلي

تمارين 2 $\Leftarrow$ 8 الصفحة 135

تمارين 16 $\Leftarrow$ 26 الصفحة 137

ملاحظات حول سير الحصة :

لنأخذ معاً

التقويم