

3 نفرض أنه توجد دالة ثانية g تحقق $g' = g$ و $g(0) = 0$ ، بمأن f لا تنعدم على $\mathbb{R}$ ، نعتبر الدالة k المعطاة على $\mathbb{R}$

$$k(x) = \frac{g(x)}{f(x)} \quad \text{ب:}$$

• تبيان أن الدالة k ثابتة على $\mathbb{R}$

k قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و دالتها المشتقة k' حيث

$$k(x) = \frac{g'(x)f(x) - f'(x)g(x)}{[f(x)]^2} = \frac{g(x)f(x) - f(x)g(x)}{[f(x)]^2} = 0$$

ومنه k ثابتة على $\mathbb{R}$

• الإستنتاج أن: $f(x) = g(x)$

$$k \text{ ثابتة على } \mathbb{R} \text{ ولدينا: } 1 = \frac{g(0)}{f(0)} = \frac{1}{1} = 1 \text{ ومنه } k(0) = 1 \text{ ومنه } \frac{g(x)}{f(x)} = 1 \text{ ومنه } g(x) = f(x)$$

نستنتج أن الدالة f دالة وحيدة .

4 ليكن y عدد حقيقي كفي ثاب ، نعتبر الدالة i المعرفة على $\mathbb{R}$ ب: $i(x) = \frac{f(x+y)}{f(y)}$

• تبيان أن: i دالة ثابتة على $\mathbb{R}$

الدالة i قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و دالتها المشتقة i' حيث

$$i'(x) = \frac{f'(x+y)f(x) - f'(x)f(x+y)}{[f(x)]^2} = \frac{f(x+y)f(x) - f(x)f(x+y)}{[f(x)]^2} = 0$$

• إثبات أن $i(x) = f(y)$

$$\text{لدينا } i(x) = f(y) \text{ ومنه } i(x) = i(0) = \frac{f(y)}{f(0)} = f(y)$$

• إثبات أن: $f(x+y) = f(x)f(y)$

$$\text{لدينا: } i(x) = \frac{f(x+y)}{f(x)} \text{ و } i(x) = f(y) \text{ ومنه } f(x+y) = f(x)f(y)$$

• إثبات أن: $f(x-y) = \frac{f(x)}{f(y)}$

$$\text{لدينا: } f(x-y) = f(x + (-y)) = f(x)f(-y)$$

$$\text{بمأن } f(y)f(-y) = 1 \text{ فإن } f(-y) = \frac{1}{f(y)} \text{ ومنه } f(x-y) = \frac{f(x)}{f(y)}$$

5 ليكن n عددا صحيحا نسبيا و لتكن j الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ ب: $j(x) = \frac{f(nx)}{[f(x)]^2}$

• إثبات أن j دالة ثابتة

الدالة j قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و دالتها المشتقة j' حيث :

$$\begin{aligned} j'(x) &= \frac{(f(nx))' \times [f(x)]^n - ([f(x)]^n)' \times f(nx)}{(f(x))^{2n}} \\ &= \frac{nf'(nx) \times [f(x)]^n - nf'(x) [f(x)]^{n-1} \times f(nx)}{(f(x))^{2n}} \\ &= \frac{nf'(nx) \times [f(x)]^n - nf(x) [f(x)]^{n-1} \times f(nx)}{(f(x))^{2n}} \\ &= \frac{n[f(x)]^n (f'(nx) - f(nx))}{[f(x)]^{2n}} \\ &= \frac{n(f'(nx) - f(nx))}{[f(x)]^n} \\ &= 0 \end{aligned}$$

إذن الدالة j دالة ثابتة على $\mathbb{R}$

• إستنتاج أن من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(nx) = [f(x)]^n$

$$\text{من أجل كل عدد حقيقي } x: 1 = \frac{f(0)}{[f(0)]^n} = j(0) = j(x)$$

$$\text{لدينا من أجل كل عدد حقيقي } x: j(x) = 1 \text{ أي } \frac{f(nx)}{[f(x)]^n} = 1 \text{ ومنه } f(nx) = [f(x)]^n$$

تسمى الدالة الوحيدة f القابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ حيث: $f(0) = 1$ ، $f' = f$ الدالة الأسية النيبيرية و نرمز لها بالرمز EXP

1 الدالة الأسية

مبرهنة وتعريف

توجد دالة وحيدة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ بحيث $f' = f$ و $f(0) = 1$ نرسم إلى هذه الدالة بالرمز "exp" ونسميها الدالة الأسية النيبيرية
 من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) = \exp(x)$ وتقرأ أسية x

ملحوظة: الدالة الأسية هي حل خاص للمعادلة التفاضلية $y' = y$ التي تحقق $y(0) = 1$
1 خواص الدالة الأسية

خاصية: الدالة الأسية قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة $\exp'(x) = \exp(x)$

خاصية: الدالة الأسية مستمرة على $\mathbb{R}$ و $\exp(0) = 1$

خاصية: الدالة الأسية موجبة تماما على $\mathbb{R}$ أي من أجل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$: $\exp(x) > 0$

البرهان

نستعمل مبرهنة القيم المتوسطة على المجال $[0; c]$
 من أجل كل عدد حقيقي x (*) $\exp(x) \neq 0$
 الدالة $\exp$ مستمرة على $\mathbb{R}$
 بفرض وجود عدد حقيقي c حيث $\exp(0) \cdot \exp(c) < 0$ يعني $\exp(x) = 0$ تناقض
خواص جبرية

$$\exp(x+y) = \exp(x) \times \exp(y) \text{ ③ } \quad \exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)} \text{ ② } \quad \exp(x) \neq 0 \text{ ①}$$

$$\exp(nx) = [\exp(x)]^n \text{ ⑤ } \quad \exp(x-y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)} \text{ ④}$$

2 العدد e والترميز e^x

العدد e هو صورة العدد 1 بالدالة الأسية أي $e = \exp(1)$. تعطينا الحاسبة $e \approx 2.718281828$.
 من أجل كل عدد صحيح نسبي n ، $\exp(n) = \exp(n \times 1) = [\exp(1)]^n$ ،
 لدينا إذن: من أجل كل عدد صحيح نسبي n ، $\exp(n) = e^n$.
 اصطلاحا نرمز، من أجل كل عدد حقيقي x ، إلى $\exp(x)$ بـ e^x .

كتابة الخواص السابقة بإستعمال الترميز الجديد

$$e^{x+y} = e^x \times e^y \text{ ③ } \quad e^{-x} = \frac{1}{e^x} \text{ ② } \quad e^x \neq 0 \text{ ①}$$

$$(e^x)' = e^x \text{ ⑦ } \quad e^0 = 1 \text{ ⑥ } \quad e^{nx} = (e^x)^n \text{ ⑤ } \quad e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y} \text{ ④}$$

مثال

بسط العبارات التالية : $a = (e^x)^3 \times e^{-5x} \times e^{2x}$ $b = \frac{e^{2x+3}}{e^{2x} \times e^2}$ $c = \frac{e^{2x} + e^x}{e^{2x}}$

$$c = \frac{e^{2x} + e^x}{e^{2x}} \\ = \frac{e^{2x}}{e^{2x}} + \frac{e^x}{e^{2x}} \\ = 1 + e^{-x}$$

$$b = \frac{e^{2x+3}}{e^{2x} \times e^2} \\ = \frac{e^{2x+3}}{e^{2x+2}} \\ = e^{2x+3} \times e^{-(2x+2)} \\ = e^{2x+3-2x-2} \\ = e$$

$$a = (e^x)^3 \times e^{-5x} \times e^{2x} \\ = e^{3x} \times e^{-5x} \times e^{2x} \\ = e^{3x-5x+2x} \\ = e^0 \\ = 1$$

تطبيق

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$

بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$ فإن: $f(-x) = 1 - f(x)$ وفسر النتيجة بيانيا

$$f(-x) = \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} = \frac{\frac{1}{e^x}}{1+\frac{1}{e^x}} = \frac{\frac{1}{e^x}}{\frac{e^x+1}{e^x}} = \frac{1}{e^x+1} \\ 1 - f(x) = 1 - \frac{e^x}{1+e^x} = \frac{e^x - e^x + 1}{e^x+1} = \frac{1}{e^x+1}$$

إذن $f(-x) = 1 - f(x)$

نتيجة: نستنتج أن النقطة $A(0; \frac{1}{2})$ مركز تناظر للمنحنى (C_f)

تمرين محلول

: نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$

① بين أن الدالة f فردية.

② بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f(2x) = \frac{2f(x)}{1+[f(x)]^2}$

الحل

① من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $(-x)$ ينتمي إلى $\mathbb{R}$ ولدينا:

$$f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{\frac{1}{e^x} - 1}{\frac{1}{e^x} + 1} = \frac{\frac{1-e^x}{e^x}}{\frac{1+e^x}{e^x}} = -\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = -f(x)$$

②

$$\frac{2f(x)}{1+[f(x)]^2} = \frac{2\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)}{1+\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2} = \frac{2\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)}{\frac{(e^x+1)^2+(e^x-1)^2}{(e^x+1)^2}} \\ = \frac{2\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)}{\frac{2(e^{2x}+1)}{(e^x+1)^2}} = \left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right) \frac{(e^x+1)^2}{(e^{2x}+1)}$$

$$\frac{2f(x)}{1+[f(x)]^2} = \frac{(e^x-1)(e^x+1)}{(e^{2x}+1)} = \frac{(e^{2x}-1)}{(e^{2x}+1)} = f(2x) \text{ ومنه}$$

وهكذا نجد أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f(2x) = \frac{2f(x)}{1+[f(x)]^2}$

تمرين منزلي — {2-3} — بي نصف {102} حجة

ملاحظات حول سير الدرس

.....
.....
.....



د15



د15