リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年11月8日（日）

第57号　朝刊

きょうの紙面　▶ 骨折 × 二次予防　▶ 脳卒中 × 嚥下と気分　▶ 運動療法 × 血圧　▶ 短信 8本

■ 骨折 × 二次予防

手首の骨折は次の大腿骨骨折の入口

静岡の保険データ4万7,178人　骨粗鬆症の治療開始は17.6%どまり

高齢者の手首の骨折（橈骨遠位端骨折）が何を映しているかを、静岡県の医療・介護レセプト（国保データベース）で調べた後ろ向き研究が、JBJS Am誌（2026年8月27日オンライン）に出た。2012～2022年に新たに手首の骨折と診断された65～89歳を、腕の打撲の人と傾向スコアで照合し、2万3,589組・4万7,178人（平均77.6歳、女性87.8%）を比べた。

手首の骨折の人は、その後の大腿骨近位部骨折が100人年あたり2.58件で、打撲の人の2.00件より多かった。1年以内に骨粗鬆症の治療を始めた人は17.6%で、打撲の7.7%の倍以上だが、8割強は治療を始めていない。死亡は調整前こそ骨折の人のほうが少なかった（ハザード比0.90）が、介護認定の状態で調整すると差はなくなった（0.98）。

著者らは、手首の骨折は全身のフレイルが進んだ状態よりも、体は動けているのに骨が弱っている状態を映すと考えている。同じデータベースの別の研究でも、手首の骨折の86%は要介護認定のない人に起きていた。観察研究だが、手首の骨折で関わった時点が、次の手首の骨折で、次の骨折を止める。

骨折を防ぐ入口になる。



出典 J Bone Joint Surg Am ↗

数字で見る

47,178人
解析対象（2万3,589組）

2.58件
後の大腿骨骨折／100人年（打撲2.00）


17.6%
1年内の骨粗鬆症治療開始（打撲7.7%）

■ 脳卒中 × 嚥下と気分

血栓回収後の経鼻胃管 90日後の不安・抑うつと関連

太い血管が詰まる脳梗塞で血栓回収療法を受け、血流が再開した575人を、国際多施設RCT「ENCHANTED2/MT」のデータで事後解析した。入院中に経鼻胃管を入れたのは280人（48.7%）。90日後にEQ-5D-3Lで不安・抑うつがあると答えた人は、経鼻胃管ありで38.6%、なしで15.6%だった。

臨床的な因子で調整してもオッズ比2.97、傾向スコアで175人ずつ揃えた後も37.7%対21.1%



（OR 2.26、95%信頼区間1.41～3.65）で、入院時NIHSSが15以下の人で関連が強かった。観察的な関連で原因とは言えないが、経鼻胃管が必要だった人は、嚥下訓練と並行して気分の変化にも目を向ける対象になる。

出典 J Clin Neurosci ↗

■ 運動療法 × 血圧

空気椅子の効果 週1回でも一部は残る

血圧が正常～正常高値の成人100人に、壁にもたれて膝を曲げたまま止まるウォールシットなどの下肢の等尺性運動を4週間・週3回行い、その後4週間を週3・2・1・0回で続ける群と対照群の5群に無作為に分けた。4週後、運動した群は対照と比べて収縮期血圧が平均9.45mmHg、拡張期血圧が5.47mmHg下がった。

8週の時点で、週1～3回の群は収縮期血圧と平均血圧の低下を保ち、下げ幅は週3回が最大だった。週0回の群は対照と差のない水準に戻った。対象は患者でなく期間も短いが、退院後の自主練習で頻度が落ちても、週1回でも続ければ効果が一部残る目安になる。



出典 BMJ Open Sport Exerc Med ↗

短信

〈嚥下〉 **65歳以上、収入が高いほど嚥下障害少**
日本の地域住民9,912人の横断研究。EAT-10で評価。男性は年齢を問わず学歴とも逆相関。 出典 Dysphagia ↗

〈嚥下〉 **誤嚥は筋の強さより収縮時間の長さ**
サルコペニア疑いの高齢者56人。舌骨上筋の筋電図で収縮から弛緩まで1.64秒超は特異度93%。 出典 Dysphagia ↗

〈嚥下〉 **嚥下の負担感、介護者が本人より重く**
患者と介護者60組。EAT-10中央値は本人18.5、介護者23。差は軽症で目立つ。 出典 Dysphagia ↗

〈心リハ〉 **HFpEFの外来心リハで左房機能が改善**
早期HFpEFの21人（中央値80歳）。最高酸素摂取量13.3→15.0、左房機能の改善と相関。 出典 J Echocardiogr ↗

〈物理療法〉 **過活動膀胱の脛骨神経刺激、電流で差なし**
インドの女性対象の二重盲検RCT。ダイアダイナミック電流とTENSで症状・QOLの改善に差なし。 出典 PLoS One ↗

〈栄養〉 **高齢ICUで栄養指標が低いほど嚥下障害**
米国MIMIC-IVの1,576人。GNRI最上位4分の1は最下位よりOR0.34。 出典 Medicine ↗

〈骨折〉 **寛骨臼骨折後、アスピリンでDVT少なく**
照合1,174組の後ろ向き比較。90日のDVTはアスピリン2.56%、他剤4.34%。 出典 Injury ↗

〈嚥下〉 **頸椎前方手術、多椎間で嚥下障害が多い**
1,705人の登録データ。12か月で多椎間29%対単椎間21%。術前の嚥下障害・糖尿病も因子。 出典 J Neurosurg Spine ↗