リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年10月15日（木）
第35号 朝刊

きょうの紙面 ▸ 心リハ・学会 ▸ 退院支援・米国 ▸ 大腿骨骨折・北欧 ▸ 短信 8本

■ 心リハ・学会

心リハ学会、「歩行ガイド心リハ」ハンドブックを公開

CPXが難しい高齢・フレイル患者を、歩行能力の4段階で評価・目標設定

日本心臓リハビリテーション学会が「歩行ガイド心臓リハビリテーションハンドブック」（全87ページ）を公開した。対象は、高齢・フレイル・併存疾患で身体機能が落ちた心疾患患者。従来の心リハは心肺運動負荷試験（CPX）で運動処方を決めるが、CPX自体が難しい患者が増えている。そこで歩行能力を、評価と目標設定の共通の物差しにする。

歩行能力は「歩行ステータス」の4段階で層別する。長距離歩行が自立したA、中距離歩行が自立したB、短距離なら歩けるC、歩けないか常に介助が要るDで、期待するアウトカムも段階ごとに分けた（Aは運動耐容能と生命予後、C・Dは介護負担の軽減など）。訓練はベッドサイドから屋外歩行までの4ステップに整理し、80m程度歩けたら次の段階を検討、病棟内では監視下で10分程度の歩行継続を目標にする。

一方で、要介助から非歩行の層への介入は「エビデンスの空白域」と明記し、運動の具体的なプロトコールはあえて示していない。栄養・嚥下・せん妄の事前評価も重視する。回復期の心大血管リハで、チームと本人・家族が目標をそろえる共通言語として使えそうだ。



歩行能力を評価と目標設定の軸にする。プロトコールは示さず。

出典 日本心臓リハビリテーション学会 ↗

数字で見る

87頁	4段階	80m
ハンドブックの分量	歩行ステータスA〜D	訓練ステップを上げる歩行距離の目安

■ 退院支援・米国

高齢TBI、退院後リハの利用は必要度より非臨床要因で差

米メディケアのデータで、入院リハ施設を退院した外傷性脳損傷（TBI）の高齢者2万3,036人を追った。90日以内のリハは在宅OT52%・在宅PT67%が中心で、外来OTは15%、外来PTは27%だった。

セルフケアが低いほどOTを受けていたが、移動能力は外来PTの利用を予測しなかった。地方在住、人種、未婚、メディケイドなど非臨床の要因で利用が少ない。観察研究で因果は言えないが、退院支援で「届いていない人」を確かめる手がかりになる。



出典 J Gen Intern Med ↗

■ 大腿骨骨折・北欧

大腿骨近位部骨折の術後2年死亡、教育歴が短いほど高く

2015〜20年に緊急手術を受けた5万8,641人（年齢中央値83歳）が対象。術後2年の死亡率は35.3%で、教育歴12年超と比べた調整オッズ比は9年未満で1.25と段階的に上がった。絶対リスクの差は6.3%。

所得や社会サービスの利用も関連したが、教育歴が最も強かった。観察研究のため、教育歴そのものが原因とは言えない。著者はヘルスリテラシーとの関係に触れており、説明や退院指導を相手の理解に合わせる意味を補強する。



出典 Br J Anaesth ↗

短信

〈ST〉 **声の障害で認知機能低下リスク1.3倍**

米EHR83万人の後ろ向き研究。音声障害でHR1.29、難聴を併せるとHR2.04。交絡の余地は大きい。 出典 J Voice ↗

〈転帰先〉 **脳梗塞後の回復期施設行き、年齢と併存症で減る**

病前自立の236人。加齢（OR0.95/歳）と併存症で入院リハ行きが減り、NIHSSや動作能力は調整後に関連せず。

出典 Front Rehabil Sci ↗

〈評価〉 **糖尿病外来で歩行速度、28m計測が現実的**

英国の診療所で30人。計測歩行1.12m/sは加速度計1.15m/sとほぼ一致。トレッドミルは時間がかかる。 出典 Fam Pract ↗

〈多職種〉 **慢性腰痛の心理社会的介入、壁は自信と時間**

豪リハ病院の療法士18人に面接。チームと開放的な訓練室が促進要因、心理面への自信不足と時間不足が障壁。

出典 Disabil Rehabil ↗

〈医療AI〉 **筋骨格エコーのAI描出、5関節で専門家と高い一致**

79人・3,017動画で120構造を評価。多くで一致率0.90超、腱・筋・神経は0.97以上。単一製品の評価。 出典 AJPMR ↗

〈機器〉 **高齢者の移動ウェアラブル、AI活用は197研究中14件**

スコーピングレビュー。加速度計が63.5%で主流。実生活での長期評価は乏しく、プライバシーや信頼が壁。

出典 Disabil Rehabil Assist Technol ↗

〈規制〉 **電子カルテのAI開示、35社とも不揃いでも認証済み**

米国の透明性要件への対応を分析。リスク分析や統治の記載は不完全でばらつくが、全社が認証を受けていた。

出典 npj Digit Med ↗

〈研究〉 **脳卒中リハRCT、カナダは世界3,602本中106本**

書誌分析。カナダの試験は慢性期が多く、活動・参加の評価を使う傾向。慢性期試験ほど規模が小さい。

出典 Can J Neurol Sci ↗