

■ 心不全／心臓リハビリ

急性心不全56万人、心リハ実施で院内死亡のオッズ0.39～0.49倍

日本の全国データJROAD-DPC(2012～2023年)・ADLは3日前後の開始が最良

2012～2023年に急性心不全で入院した564,830人を、日本の循環器疾患診療実態調査のDPCデータ(JROAD-DPC)から抽出した。心リハなしの275,454人と、開始日で分けた4群(1日以内/2～3日/4～5日/6日以上)を比べ、32の交絡因子を傾向スコアの重み付けで調整している。

院内死亡はどの開始時期の群も心リハなし群より

り低かった(調整オッズ比0.39～0.49)。退院時のバーセル指数は1日以内～5日の群で3.2～3.8点高く、6日以上群では差が小さかった。開始日との関係を曲線で見ると、死亡が最も低いのは6.1日、機能面が最も良いのは3.3日で、指標によって「良い時期」が異なった。

観察研究のため、心リハを受けられる状態の人ほど予後が良いという偏

りは残る(不死時間バイアスの感度分析では死亡の結果は一貫)。バーセル指数の差も3～4点と小さく、著者らは前向き研究での確認が必要としている。「早いほど良い」と一律には言えず、ADLを狙うなら入院早期から、という読み方が妥当だ。



ADLを狙うなら入院早期から、死亡は幅広い時期で低い

出典 [Journal of the American Heart Association](#)

数字で見る

564,830人

急性心不全の入院患者(全国DPC)

0.39～0.49倍

心リハ群の院内死亡の調整オッズ比

3.3日

機能面が最も良好だった開始時期

■ 診療報酬／回復期リハ病棟

回復期リハ病棟入院料2・3・4、経過措置が9月30日で終了

令和8年度改定で見直された施設基準には、3月31日時点で届け出ていた病棟向けの経過措置があった。入院料2は実績指数、入院料3は週7日の提供体制、入院料4はその両方を、9月30日まで「満たしているものとみなす」扱いだった(告示第70号)。

10月以降も算定するには、別添7と様式49(入院料2)・様式49の2(入院料3)、入院料4はそのすべてを10月14日(水)必着で届



け出る。土日を含む週7日の提供を組めるか、実績指数を安定して出せるかが分かれ目になる。正式な様式と提出先は各地方厚生局の案内で確かめたい。

出典 [PT-OT-ST.NET\(厚生局の案内\)](#)

■ 歩行評価／ウェアラブル

生活の場の歩行計測、脳卒中は6報217人のみでメタ解析できず

自宅や地域など日常生活の場での歩行をウェアラブルで測った研究を集めた系統的レビュー(スイス・イタリア)。43報・2,991人のうち、パーキンソン病は37報・2,774人、脳卒中は6報・217人にとどまった。

パーキンソン病は歩行速度 0.84m/秒 (95%CI 0.77～0.91)、1日7,202歩などが示されたが、研究間のばらつきが極めて大きい。脳卒中は測り方



がそろわずメタ解析できなかった。著者らは脳卒中を「決定的に未整備」とし、装着部位や解析法の標準化を求めた。退院後にどれだけ歩いているかを測る物差しは、まだ研究段階にある。

出典 [JMIR](#)

短 信

〈介護保険〉介護2割負担の拡大、利用控えの検証求める

介護保険部会。単身の所得基準280万→230～260万円案、影響は約35万人の推計 出典 [PT-OT-ST.NET](#)

〈養成教育〉PT卒前コアカリ、10項目に再編

日本理学療法教育学会。新設はIT活用・チームワーク・学修とリフレクションの3項目 出典 [POST](#)

〈心臓リハビリ〉心リハの男女差、最大の壁は「紹介」

46コホート100万人超のSR。紹介率は女性57.8%・男性67.2%、紹介後は差が縮小 出典 [Catheter Cardiovasc Interv](#)

〈脳卒中／デジタル〉高齢脳卒中患者のデジタル忌避、支援で低く

上海の343人。eヘルスリテラシーと周囲の支援が高いほどテクノフォビアが低い 出典 [JMIR](#)

〈パーキンソン病〉歩き始めは専用の練習で第1歩が伸びる

10人のクロスオーバー予備研究。歩き始めに絞った訓練で第1歩が長く速くなり1週後も維持、連続歩行の訓練では変化なし 出典 [J Neurol Phys Ther](#)

〈腰痛／運動〉慢性腰痛の運動、最適量は定まらず

239試験の用量反応NMA。短期は週3～4回で改善、84%が高バイアスで確実性は低 出典 [Br J Sports Med](#)

〈脊髄損傷〉脊損後のオピオイド、急性期の常用が尾を引く

豪州の質的研究23人。回復期・地域へ持ち越され、かかりつけ医に負担が集中 出典 [Disabil Rehabil](#)

〈糖尿病／脳卒中〉GLP-1薬で脳卒中リスク半減と関連

スウェーデン糖尿病登録17万人超の観察研究。全脳卒中49%低下、因果は未確定 出典 [Medical Tribune](#)