リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年11月6日（金）

第55号　朝刊

きょうの紙面　▶脳卒中 × 身体活動　▶制度 × 訪問リハ・訪問看護　▶大腿骨骨折 × 入院経路　▶短信 8本

■ 脳卒中 × 身体活動

歩行未自立の脳卒中389人 自立歩行は2METs台の活動と関連

11施設の前向きコホート　観察研究で因果は言えない

脳卒中でリハ病棟（亜急性期）に入り、まだ歩行が自立していない人で、入院直後の身体活動の強さと回数が1か月後の自立歩行とどう関わるかを調べた前向きコホートが、Stroke誌に載った。11施設で、入院時のFunctional Ambulation Category（FAC）が1〜2の389人（平均68.1歳、女性45.0%）に、加速度計を1週間つけてもらった。

1か月後にFAC 4以上の自立歩行に達したのは113人。2.0〜2.9METsの活動（high-LPA）は5分/日増えるごとにリスク比1.067（95%信頼区間1.010〜1.131）で関連し、1.6〜1.9METsと3.0METs以上は関連がなかった。2.0METs以上の5〜10分未満の短い活動の回数もリスク比1.208（1.060〜1.375）で関連し、10分以上続く活動は関連しなかった。

観察研究のため活動が歩行をもたらしたとは言えず、歩けそうな人ほど動いた逆向きの関係も残る。それでも、2METs台の活動を短く何度も日課に入れるという目安は、病棟生活を組む材料にな



短く、何度も。

る。

出典 Stroke（AHA）↗

数字で見る

389人
入院時に歩行が未自立（FAC1〜2）

113人
1か月後に自立歩行（FAC4以上）


1.208倍
2METs以上の短い活動の回数（リスク比）

■ 制度 × 訪問リハ・訪問看護

財務省、訪問リハと訪問看護の報酬適正化を財政審で提起

財務省は11月4日、財政制度等審議会の分科会に社会保障の資料を出した。訪問リハでは、同じ建物の利用者に集中して提供する事業所に同一建物減算（▲10〜15%）がかかるのに、個別に訪問する事業所より収支差率が顕著に良いとした。訪問リハ全体の収支差率は令和6年度決算で10.8%で、全サービス類型の平均より顕著に高い。

訪問看護では、理学療法士等の職員割合が過半



の事業所の収支差率14.1%を「依然として高い」とし、どちらも提供実態を踏まえた報酬の適正化を求めた。財務省の考え方で、改定内容が決まったわけではない。

出典 財務省 財政制度分科会（11/4）↗

■ 大腿骨骨折 × 入院経路

股関節骨折、内科入院は1年死亡のオッズ比3.01

65歳以上で股関節骨折の手術を受けた人を、整形老年共同管理の病棟に入院した群と内科に入院した群で比べた、米国の安全網病院1施設の後ろ向きコホート。443人（共同管理349人、内科94人）で、内科入院は1年死亡のオッズ比3.01（95%信頼区間1.53〜5.83）、24時間超の手術遅延は3.16（1.98〜5.12）だった。

年齢・性別・ASAをそろえた91組でも同じ向き



で、調整後の1年死亡は2.66（1.32〜5.25）。単施設で内科群は94人と少なく、入院先の決まり方も分からない。手術までの待ち時間は、転院時の情報で見ておきたい。

出典 J Am Geriatr Soc ↗

短信

〈歩行解析〉スマホ動画の歩行解析、健常者で検証
健常成人でGAITRiteと比較。時間指標の誤差は5%以内、空間指標の平均は2%未満。患者では未検証。
出典 Front Rehabil Sci ↗

〈医療AI〉作業療法士30人がAI助言者に望むこと
デザイン思考の質的研究。孤立感や難しい関わりへの助言が論点に。効果検証はまだない。 出典 Work ↗

〈サルコペニア〉ポリフェノール、筋への効果は一貫せず
高齢者のRCT5本の統合。筋力改善は2本のみで、治療推奨に足る根拠はないと著者。 出典 GeroScience ↗

〈小児リハ〉小児CPのロボット歩行訓練を総括
アンブレラレビュー。粗大運動（GMFM）は改善、歩行速度などは結果が一貫せず。 出典 Disabil Rehabil ↗

〈外傷〉高齢の重症外傷、WWI高値で死亡増
韓国の1.8万人を20年追跡。最高三分位の死亡ハザード比1.72。予後指標の関連で介入ではない。 出典 Injury ↗

〈感染症〉mRNA RSVワクチン、入院を82%抑制
米退役軍人の50歳以上約15万人の観察研究。24週時点のRSV関連入院に対する推定有効率81.8%。
出典 Medical Tribune ↗

〈制度〉参院委でリハ質疑、省庁連携会議に言及
理学療法士の議員が25分をリハに充てた。厚労相は厚労省中心の連携会議を作りたいと答弁。 出典 POST ↗

〈骨粗鬆症〉骨と筋を一体でみる総説
骨粗鬆症とサルコペニアを合わせた有病率は18.5%、骨折のハザード比2.13。主張の多くは仮説段階。 出典 PubMed ↗