リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年11月10日（火）
第59号 朝刊

きょうの紙面 ▸ せん妄 × 認知機能 ▸ 心臓リハ × 代替手段 ▸ 介護報酬 × 中山間地 ▸ 短信 8本

■ せん妄 × 認知機能

入院中のせん妄、その後の認知症リスク5.39倍

米国の地域コホート3,501人を中央値7.2年追跡　認知機能の低下も加速

入院中のせん妄と、その後の認知機能の経過を追った研究がJAMA Neurology誌に出た。米国ミネソタ州オルムステッド郡の住民コホートから、入院歴があり認知症のない3,501人（年齢中央値74.1歳）を中央値7.2年追跡している。せん妄は入院と退院後30日までの診療記録を自然言語処理で判定し、記録があったのは75人（2.1%）だった。

年齢・性別・教育歴・APOE ε4で調整すると、せん妄のあった人は軽度認知障害のリスクが3.67倍（95%信頼区間2.19～6.15）、認知症が5.39倍（2.94～9.85）だった。5年間のMMSE換算の低下はせん妄あり2.28点、なし0.43点だった。

せん妄の例数は75人と少なく、記録に残らない軽いせん妄は見逃された可能性がある。入院の重症度は調整に含まれず、対象は単一の郡の白人中心の集団で、因果関係までは言えない。回復期ではせん妄歴の申し送りと、退院後の認知機能の確認につなげられる。



退院のあとまで、せん妄の記憶を手渡せるか。

出典 JAMA Neurology ↗

数字で見る

3,501人
入院歴があり認知症のない住民

3.67倍
軽度認知障害の調整ハザード比

5.39倍
認知症の調整ハザード比

■ 心臓リハ × 代替手段

心不全のヨガ心臓リハ 心イベント抑制は有意差なし

インド16施設の左室駆出率低下心不全を、監督下ヨガ3か月の群1,737人と冊子の群1,755人に割り付けたYoga-CaRe HF試験。15か月の死亡・再入院・脳卒中の複合は21.0%対22.8%で、有意差はなかった（調整HR 0.90、95%信頼区間0.79～1.05）。

一方、3か月時点でQOL（MLHFQ）は8.1点、6分間歩行距離は25.5m改善し、歩行と健康状態の差は24か月まで続いた。非盲検で比較相手は運動療法でなく、報告は学会発表の段階で論文は未確認。運動型の心臓リハに通えない人の、機能とQOLの選択肢として読む結果だ。



出典 MedPage Today（AHA 2026）↗

■ 介護報酬 × 中山間地

通所リハも特別地域加算へ 厚労省が対象拡大案

厚生労働省は11月6日の介護給付費分科会で、通所リハなど通所系を、中山間地域等の事業所向けの特別地域加算（所定単位数の15%）と小規模事業所加算（10%）の対象に加える案を示した。通所系に適用する水準は未提示で、送迎の負担を示すデータも通所介護の事業所のものだ。

9日の介護保険部会では、特例の報酬でも維持できない地域に限り、訪問介護や通所介護を保険給付でなく市町村の委託事業として高い単価で行う「特定地域事業」の考え方が示された。こちらの対象に通所リハは入らず、医療系へ広げるには法改正が要る。どちらも単価や水準は未定だ。



出典 POST／GemMed ↗

短 信

〈脳卒中〉 若年脳卒中、30年で増加
米国5郡の初発2,076例。20～54歳の発症は10万人年33.9件から62.18件へ増えた。 出典 Neurology ↗

〈運動器〉 膝OAの痛み、レタトルチドで改善
肥満を伴う膝OAの第3相2試験。WOMAC痛みは改善、重い有害事象は実薬で多い。 出典 NEJM ↗

〈老年〉 高齢者の抑うつに太極拳が上位
心身運動23RCTの解析でSUCRA 83.3%。多くは信頼区間が0をまたぐ。 出典 Front Public Health ↗

〈外傷〉 外傷後敗血症、発生例の死亡42%
日本の外傷登録12万6,433人で発生0.77%。院内死亡42.4%対4.6%。 出典 BMJ Open ↗

〈嚥下〉 頭頸部がん後の嚥下障害は1年で減少
445人の追跡。中等度以上は治療3か月後21.6%、12か月後12.5%。 出典 Head Neck ↗

〈脊損〉 不全脊損、歩行適応訓練にばらつき
退院3～6か月の14人に面接。状況に合わせて歩く力は地域復帰に重要と語り、訓練の内容は施設で差があった。
出典 JNPT ↗

〈がんリハ〉 PT・OTの切れ目ない連携を提言
オーストリアで当事者と専門職ら36人が3日間の共同作業。全病期で連携し、早期の情報提供を求める質的研究。
出典 Disabil Rehabil ↗

〈透析〉 透析のサルコペニアにIL-6高値
透析61人と健常20人の横断研究。サルコペニアはIL-6高値と関連（OR 1.17）。指標の候補を示す段階だ。
出典 PubMed新着 ↗