リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年10月26日（月）

第45号　朝刊

きょうの紙面　▶回復期リハ・腎機能　▶歩行評価・測定誤差　▶嚥下・代償姿勢　▶短信 8本

■ 回復期リハ・腎機能

回復期の腎機能低下 ＦＩＭ利得小さく

一日当たりの効率に有意差なし　在院期間なども検討を

研究では、２０１４～２０２３年に回復期リハ病棟へ入院した１０，８３２人、平均７３・１歳を後ろ向きに解析した。透析導入前の患者を腎機能の重症度で分け、入退院時のＦＩＭから利得、日当たりの効率、改善可能分に対する達成割合を比較した。主な比較は軽度低下までの群と、ＣＫＤステージ３ｂ～５の進行した低下群だった。

進行した低下群は、ＦＩＭ利得が１４・６対１６・９点、達成割合が０・３４対０・４０と低く、在院日数も５２・６対５９・６日と短かった。いずれもＰ＜０・００１。一方、日当たりのＦＩＭ利得を表す効率には差がなかった（Ｐ＝０・９８）。年齢や栄養、貧血など患者背景の違いにも留意が必要だ。

腎機能が低い人は一律に改善しない、とは読めない。在院期間や総リハ量の違いも関係し得るが、観察研究なので因果は決められず、入院延長の効果も示していない。腎機能だけで目標を下げず、全身状態と練習できた日数・量を併せて確認



改善の総量と日当たりの効率を分けて捉える

したい。

出典 Journal of Nephrology ↗

数字で見る

10,832人
回復期入院を後ろ向き解析

14.6点
進行した腎機能低下群のFIM利得

16.9点
軽度低下までの群のFIM利得

■ 歩行評価・測定誤差

観察歩行評価は有望 個人の変化は慎重に

神経疾患の観察歩行評価７種類について、２８論文・６３研究の測定特性を整理した。脳卒中のＷＧＳとＧ．Ａ．Ｉ．Ｔは比較的よく研究され有望だが、測定誤差が大きく、全面的な推奨に至る尺度はなかった。

著者らは両尺度の使用を集団レベルや横断評価に限るべきとする。ＷＧＳは１４項目、Ｇ．Ａ．Ｉ．Ｔは３１項目。点を同じように付けられるこ



とと、小さな変化が誤差を超えることは別だ。観察条件をそろえ、歩行速度や介助量など別の指標も合わせて変化を確かめたい。

出典 Disability and Rehabilitation ↗

■ 嚥下・代償姿勢

顎引き嚥下の効果 適応は個別に確認

構造性・神経原性の成人嚥下障害を扱う１６研究を整理した。横断研究１３本、ＲＣＴ２本、コホート１本で、１０研究が顎引きの効果を報告。成功率は１９・６～８１％と幅があり、統合した有効率ではない。

証拠の確実性は低～非常に低く、どの条件で有効かの合意もない。嚥下開始、動き、食塊や患者の条件との関連は仮説段



階だ。顎引き自体を否定せず、個別評価で役立つかを確かめる必要がある。同じ姿勢を全員に勧めず、評価結果を食事介助の職種間で共有したい。

出典 Dysphagia ↗

短信

〈上肢〉**ＶＲ付き手の外骨格**

脳卒中１２人が４週練習し上肢指標は改善したが、対照群のない予備評価。機器そのものの治療効果は未確定。

出典 Biomedizinische Technik. Biomedical engineering ↗

〈連携〉**腰痛のＰＴ開始を早く**

米国７４人の後ろ向き比較。統合診療経路でＰＴ開始中央値２・５対１９日。年齢差があり因果は不明。

出典 The spine journal : official journal of the North American Spine Society ↗

〈肩〉**呼吸練習の上乗せ**

凍結肩４０人のＲＣＴで外転・外旋などに改善差。痛みの治療後群間差は有意でなく、全効果を一括しない。

出典 Journal of back and musculoskeletal rehabilitation ↗

〈肘〉**衝撃波とレーザー比較**

運動・装具を共通にした３週間の比較で疼痛は衝撃波群が良好。握力や総合機能は群間差がなく短期の結果。

出典 Journal of back and musculoskeletal rehabilitation ↗

〈生活〉**複雑な家事にも重い依存**

慢性期脳卒中１００人の横断評価。細かな手の使用３５

出典 Disability and rehabilitation ↗

〈教育〉**ＯＴ学生の車椅子研修**

アラブ圏８か国２８２人の混合研究。１１７組の前後比ない。　出典 Advances in medical education and practice ↗

〈下肢〉**ＮＭＥＳ１０試験を統合**

脳卒中５７９人の統合で運動・ＡＤＬ指標は改善。抄録

出典 American journal of physical medicine & rehabilitation

〈運営〉**ＩＣＵ嚥下対応を可視化**

ブラジル１，３１２人の記述的報告。日々の需要４５人は不明。

出典 International journal for quality in health care : journal