リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年10月22日（木）

第41号 朝刊

きょうの紙面 ▸ 物理療法・メタ解析 ▸ 退院支援・家族 ▸ 医療AI・記録 ▸ 短信 8本

■ 物理療法・メタ解析

慢性腰痛の体外衝撃波治療 痛みは減るが機能は届かず

RCT9本を統合。拡散型で痛みは軽減、機能障害の改善は意味のある差に届かず

慢性腰痛の人に体外衝撃波治療（ESWT）を行い、プラセボ・通常ケア・運動療法・理学療法と比べたRCTを集めたシステマティックレビューとメタ解析だ。7つのデータベースから430件を拾い、9本のRCTを統合した。痛みの強さと機能障害を主な評価にしている。

拡散型（rESWT）は痛みを減らした（SMD −0.72、95%CI −1.30～−0.14）。集束型（fESWT）は1試験でだけ効果が出た。機能障害も全体で改善したが（MD −6.12、95%CI −10.02～−2.22）、臨床的に意味のある最小差（MCID）には届いていない。異質性は大きく（I^2 は 75～76%）、感度分析では研究の質の影響も見られた。

多くの試験は治療の直後しか評価しておらず、数か月後の追跡はほとんどない。そのため、効果がどれだけ続くかは分からない。著者は拡散型と集束型を同じものとして扱わないよう求めている。痛みは下がるかもしれないが、生活動作が変わる根拠はまだ弱い。運動療法の代わりではなく、併用を考える時の材料として読みたい。



痛みには効く可能性。動作の改善はまだ根拠が弱い。

出典 Disability and Rehabilitation ↗

数字で見る

9本	−0.72 SMD	76%
統合したRCT	拡散型の痛みの効果量	異質性（I^2）

■ 退院支援・家族

脳・脊髄損傷の退院後1年 家族が支援の隙間を埋める

豪州クイーンズランド州で、後天性脳損傷と脊髄損傷で退院した人の家族・友人に、退院3か月後（24人）と12か月後（19人）に面接した。手探りで進む複雑な道のり、率直なやりとりで認識をそろえる大切さ、本人を理解した支え手の必要、そして家族自身が「安全網」になる負担の4つのテーマが出た。



著者は本人と家族を早くからリハと意思決定に巻き込むよう求める。1地域・数十人の質的研究だが、退院前に家族へ「誰に何を頼めるか」まで渡せているかを見直す材料になる。

出典 Disability and Rehabilitation ↗

■ 医療AI・記録

記録から蘇生方針を抽出 複雑なAI構成は精度上げず

米国の集中治療データMIMIC-IVの退院サマリー1,000件で、オープンなLLM4種（8B～27B）を単体・自己見直し付き・抽出役と確認役の複数構成で試した。性能の高いモデルでは単体が同等以上で、複数構成は処理量と時間が約2倍になり精度は上がらなかった。自己見直しはかえって成績を下げた例もある。



小さい8Bモデルでは確認役が有意に効いたが、臨床で使える水準には届かない。構成の複雑さは課題とモデルの力に合わせて選ぶ、というのが結論だ。

出典 JAMIA ↗

短信

〈心臓リハ〉 たこつぼ症候群の心臓リハ、6MWDは改善

後ろ向き57例。リハ群で6分間歩行330→364m、QOLも改善。心機能の回復は非実施群と同等。

出典 J Cardiopulm Rehabil Prev ↗

〈心臓外科〉 心臓手術後早期、歩行と自転車の心拍は同等

65歳以上のフレイル66例、術後18日。距離あたりの心拍数を新指標に提案。 出典 J Cardiopulm Rehabil Prev ↗

〈脳卒中〉 脳卒中関連肺炎、予防の柱は嚥下管理と離床

約8人に1人に起きる。予防的抗菌薬は転帰も発症率も改善せず。欧州の指針を整理。 出典 総説（PubMed） ↗

〈訪問リハ〉 訪問リハ30年、看護とリハの制度史を特集

1992年の老人訪問看護制度から令和9年度の論点まで。2020年の看護6割案は見送り。 出典 POST ↗

〈多発性硬化症〉 身体活動の指針を満たす運動、記憶を改善

RCT12本・462人のメタ解析。処理速度・記憶で改善。ただし各研究のバイアスリスクは高い。 出典 Disabil Rehabil ↗

〈脊髄損傷〉 褥瘡予防の電気刺激、家庭での継続に壁

RCTに併設した評価。参加者13人と専門職13人に面接。時間・介助・使い勝手・償還なしが障壁。 出典 Disabil Rehabil ↗

〈評価〉 呼吸筋力を安価な器具で測る方法を検証

多発性硬化症52人。閾値負荷器具の1RM方式は基準機器とICC0.82～0.91で一致し、再現性も良好。

出典 J Neurol Phys Ther ↗

〈肩関節〉 肩甲上腕関節症の理学療法、記述は不十分

134文献・156介入を分析。介入内容の記述の完全性は18%。RCTは11本だけだった。 出典 系統的レビュー ↗