リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年10月25日（日）

第44号　朝刊

きょうの紙面 ▸ 摂食嚥下・脳卒中 ▸ 退院支援・多職種連携 ▸ 大腿骨近位部骨折・パーキンソン病 ▸ 短信 8本

■ 摂食嚥下・脳卒中

脳卒中後の嚥下障害30人 センサーで見せる声門上嚥下

加速度計と鼻の気流センサーのバイオフィードバックで、2週後・1か月後のFOISが高い

脳卒中後の嚥下障害に対して、声門上嚥下の練習中の動きを「見える化」すれば成績は上がるのか。リハ病院1施設で、脳卒中後の嚥下障害の患者30人（各群15人、脱落なし）を無作為に2群へ分けた。

対照群は声門上嚥下訓練を含む通常の嚥下リハ、介入群はこれに加えて、加速度計と鼻の気流センサーによる二つの信号のバイオフィードバックを訓練中に受けた。訓練は1日30分、週6日を2週間続けた。訓練直後と1か月後のFunctional Oral Intake Scale（FOIS）は、どちらも介入群が有意に高く（p<0.001）、訓練後にPenetration-Aspiration Scale（PAS）が6以上だった人の割合も介入群で低かった（p=0.026）。

30人の単施設で、効果量と信頼区間は抄録に示されていない。追跡は1か月までで、長期の経口摂取や肺炎の予防は分からない。できているかが本人に見えにくい手技を見える形にする発想は、回復期のSTが訓練を組む材料になる。



30人・単施設・1か月追跡の小規模RCT。長期の効果は未確認。

出典 Archives of Physical Medicine and Rehabilitation ↗

数字で見る

30人
無作為化した患者（各群15人）

2週間
1日30分・週6日の訓練

0.026
PAS6以上の割合の差（p値）

■ 退院支援・多職種連携

急性期PT89人の退院先判断 根拠は経験・機能・生活背景

急性期のPTが退院後の行き先をどう決めているかを、米国の病院に勤めるPT89人に10の症例を示し、勧める退院先と理由を自由記述で答えてもらった横断調査だ。コード化された根拠1604件のうち、PT自身の経験が29.6%、患者の機能と障害が26.3%、患者の生活背景が25.3%を占めた。

69.7%のPTは複数の根拠を混ぜて判断していた。手厚い退院後ケアを勧めることと関連したのは機能と障害だけで、ORは順序モデルで1.70、二値モデルで2.21だった。症例への回答で、実際の転帰は追っていない。申し送りに生活背景も添えることが、回復期側との判断をそろえる手がかりになりうる。



出典 Physical Therapy ↗

■ 大腿骨近位部骨折・パーキンソン病

大腿骨近位部骨折5,553人 パーキンソン病208人の経過

オーストラリア・ビクトリア州の整形外傷登録（2016～2022年）から、大腿骨近位部骨折だけの5,553人を調べた観察コホートだ。パーキンソン病のある人は208人（4%）で、平均年齢は79.9歳だった。傾向スコアで調整すると、ICU入室、急性期の在院日数（調整後の中央値は6.9日と7.7日）、12か月死亡（OR 1.25、95%CI 0.85～1.82）に有意な関連はなかった。

退院先は自宅よりリハビリ施設になりやすく、RR 2.04（95%CI 1.12～3.74）だった。著者は検出力の不足を認め、差がないとは言い切れないとする。退院後の機能やADLは追っていない。



出典 Journal of Parkinson's Disease ↗

短信

〈運動失調〉 **小脳性運動失調の非薬物療法、SR**
100研究の物語的SR。PT・rTMS・tDCSでSARA/ICARSが短期改善、持続は不明。 出典 Neurology系SR（PubMed）↗

〈呼吸リハ〉 **COPDの全身振動訓練、15RCTのMA**
6分間歩行は平均34.35m改善（確実性very low）。運動介入との比較では差なし。 出典 PubMed ↗

〈心臓リハ〉 **不安・抑うつ併存の心疾患、HIITとMIIT**
後ろ向き112人。GAD-7は4.4～4.8点、PHQ-9は3.5～3.7点低下、群間差は消失。 出典 PubMed ↗

〈社会参加〉 **脳卒中後の少数派の社会参加研究**
ナラティブレビュー。共同創造と文化的謙虚さが必要との議論で、数値はない。 出典 PubMed ↗

〈ICU後〉 **COVID重症後の発話・嚥下の困難**
ICU10日超の113人中29人（26%）が困難を報告。発話に答えた16人は全員が困難。 出典 PubMed ↗

〈医療AI〉 **AIスクライブと患者向け指示の記載**
外来39万件。AIスクライブで患者指示の記載が10.5ポイント増え、AI文面は長め。 出典 JAMIA ↗

〈開業PT〉 **予約の無断欠席対策、仏PT1,246人**
リマインダーはオンライン予約78.9%・SMS77.7%が有効、院内ポスター20.0%。 出典 Physical Therapy ↗

〈足部変形〉 **CMTの尖足変形、手術+リハと運動**
後ろ向き109人。2年時に手術+リハ群で転倒−21.8%、補助具使用−25.4%。 出典 PubMed ↗