リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年11月9日（月）
第58号 朝刊

きょうの紙面 ▸ 運動器 × 手術前後 ▸ 心不全 × 運動耐容能 ▸ 医療AI × 記録 ▸ 短信 8本

■ 運動器 × 手術前後

脊柱管狭窄症の手術 術前の理学療法に良好な関連

スウェーデンの全国登録7,969人　術後だけの理学療法は成績が不良

腰部脊柱管狭窄症の手術を2021～2023年に受けた7,969人を、スウェーデンの全国脊椎手術登録（推定カバー率95%）で解析した研究がPhysical Therapy誌に出た。理学療法を受けた時期を術前のみ、術後のみ、両方、受けないの4群に分け、術後1年の痛みや機能障害、QOL、歩行、満足度などを比べている。

術前後とも受けた人と比べて、術前だけの人は全ての項目で成績が良く、意味のある改善や許容できる状態に達するオッズ比は1.39～1.56だった。術後だけの人は痛み、歩行機能、QOLが悪く、許容できる水準に達するオッズ比は腰痛0.83（信頼区間0.74～0.93）、下肢痛0.78（0.67～0.88）、機能障害0.83（0.72～0.96）だった。

受療歴は本人の申告で割り付けはなく、経過の悪い人が術後に受けた可能性もあるため、術後の理学療法が悪影響という意味ではない。著者らは「術前の理学療法は検討に値し、術後の追加は全員には必要ないかもしれない」と述べる。手術を



手術の前に、関わる機会があるか。

待つ間にどう関わるかを考える材料になる。

出典 Physical Therapy ↗

数字で見る

7,969人
腰部脊柱管狭窄症の手術（2021～23年）


1.39～1.56
術前のみ群の到達オッズ比

0.78～0.83
術後のみ群の到達オッズ比

■ 心不全 × 運動耐容能

鉄欠乏のHFpEF、鉄剤1回で最高酸素摂取量が改善

鉄欠乏のある左室駆出率の保たれた心不全65人を、デルイソマルトース第二鉄1,000mgの1回静注44人とプラセボ21人に割り付けた二重盲検RCT（IRONMET-HFpEF）。12週の最高酸素摂取量は鉄剤群で1.2mL/kg/分増え、プラセボは0.1で、群間差は1.1（95%信頼区間0.2～1.9、P=0.02）だった。



6分間歩行距離、NYHA分類も鉄剤群が良好（いずれもP<0.05）だが、患者が答えるKCCQは差がなかった。薬に関連する重い有害事象はなかった。小規模で12週までの結果なので予後は分からないが、運動耐容能が伸びにくい心不全で鉄の状態を確かめる意義を示す。

出典 Circulation ↗

■ 医療AI × 記録

リハ施設のAI記録ツール 8割が時間短縮を実感

専門リハビリ施設9か所の医師18人・心理職13人が、診察の会話から記録の下書きを作るAIツールを約4週間使った。使いやすさの指標（SUS）は平均78.3点、87.1%が今後も使いたいと答え、80.6%が記録時間の短縮、71.0%が診察中の注意の向上を実感した。



AIの記録の質は5点満点で4.3点だが、「網羅性」は3.9点で最も低く、生活背景の抜けや誤りの報告もあった。時間は実測でなく本人の実感で、対照群はない。PT・OT・STは対象外なので、導入には職種ごとの検証と人の確認が要る。

出典 JMIR Rehabil Assist Technol ↗

短信

〈医療AI〉 AI心電図の絞り込み、検出増は小幅
14,665人のRCT。主要複合0.74%対0.48%だが1例の再分類で有意差が消え、AF自体は差なし。 出典 Circulation ↗

〈医療AI〉 LLMの医療評価は課題で順位が変動
10モデル・2万5,680判定。最重症トリアージの過小評価は89.1%で、人の確認が必要と結論。 出典 JAMIA ↗

〈作業療法〉 脳卒中のCO-OP、実行機能を改善
韓国の38人のRCT。12回の介入で実行機能・作業遂行・ADLが従来の作業療法より大きく改善。
出典 HK J Occup Ther ↗

〈嚥下〉 手持ち誘導＋筋電図で嚥下が改善
脳卒中後の嚥下障害96人の後ろ向き研究。併用群のMASAは85.4点、対照は73.3点。前向き検証が待たれる。
出典 J Stroke Cerebrovasc Dis ↗

〈呼吸リハ〉 COPDの目標、1年後も半数が維持
呼吸リハ後に書面の維持計画を作成した214人。12か月時点で半数以上の目標を維持した人は51%。 出典 Respir Med ↗

〈呼吸リハ〉 筋力が伸びない人、立ち上がり速度で予測
COPD33人の4週入院。筋力非反応は60.6%で、力の立ち上がり速度の低さが予測因子だった。 出典 Respir Med ↗

〈評価尺度〉 作業の意味への気づきを測る尺度
60～80歳の133人で29項目のECOSを検証。内的一貫性はα=0.915で、QOLと中等度の相関。 出典 AJOT ↗

〈教育〉 OT学生のAI教育ニーズは3.93点
3大学230人の横断調査。自己評価のAI能力は3.42点で、臨床推論と統合した実践教育を希望。
出典 J Multidiscip Healthc ↗