

■ 睡眠薬・転倒

レンボレキサント、Z薬より 股関節骨折が少ない傾向

栃木県の65歳以上 約2.2万人、1年以内の入院を比較

高齢者の不眠に使う睡眠薬で、股関節骨折のリスクに差はあるのか。栃木県の医療データを使った研究が、J Am Geriatr Soc（10月8日号）に載りました。65歳以上で新たに睡眠薬が始まった人を追跡し、1年以内の股関節骨折による入院を比べています。

レンボレキサントとZ薬（非ベンゾジアゼピン系）

の比較は22,655人（6,879人・15,776人）で、補正後のHRは0.31（95%CI 0.16～0.59）。スボレキサントとZ薬は22,377人（6,699人・15,678人）でHR 0.57（0.23～1.44）、有意差はありませんでした。背景は傾向スコアの重み付けで補正しています。

観察研究（標的試験の模倣）で、処方背景を

完全にそろえられたとはいえません。スボレキサントは信頼区間が広く、「拮抗薬なら安全」とまでは言えません。入院中も退院後も、睡眠薬が出ている人の転倒リスクを薬剤師や医師と共有する材料になります。



睡眠薬の種類は、転倒・骨折リスクを確認する項目のひとつ。

出典 J Am Geriatr Soc ↗

数字で見る

22,655人

レンボレキサント解析の対象

0.31

レンボレキサントのHR

0.57

スボレキサントのHR（有意差なし）

■ ICU・嚥下評価

抜管後の嚥下障害 評価ツール16種を整理

COSMINの方法で2,769件の抄録から22研究を選び、16種類のツールを分類しました。測定特性が報告されたのは9種で、内容的妥当性・基準関連妥当性・信頼性の3つが評価されていたのはPost-Extubation Dysphagia Screening Toolだけでした。

全体のエビデンスの質は低～非常に低く、最適なツールは現時点で不明です。回復期へ転院する



患者にはICUで挿管されていた人もいます。病歴の「抜管後」を、嚥下スクリーニングの入り口として確認しておきたい論文です。


出典 Intensive Crit Care Nurs ↗

■ 作業療法・認知症

在宅の認知症への環境介入 OTは評価と調整を担う

2010年1月～2025年7月の4データベースを検索し、17研究を整理しました。介入は住宅改修やテクノロジーを使ったプログラムなど。OTの役割は、機能評価と環境評価、人-環境-作業の視点での介入計画、多職種チームの進行でした。

スコーピングレビューなので、効果の大きさを示すものではありません。著者は、OTの役割の



報告に不足があると指摘しています。退院前訪問や住環境調整で、評価の中身と役割分担を言語化する材料になります。

出典 Am J Occup Ther ↗

短 信

〈制度〉有料老人ホーム登録制、27年12月施行へ

厚労省検討会が示した。既存ホームの移行猶予は1年で、期限は2028年12月の見通し。法の上限より短い設定。

出典 POST ↗

〈制度〉病床機能報告、様式1は10月19日から

2026年度の報告期間を変更。様式1は10/19～12/11、様式2は11/2～12/11。再開通知までデータ提出は待つ。

出典 GemMed ↗

〈介護医療院〉継続意向83.7%、人手確保が最大の悩み

日本介護医療院協会の2026年度アンケート。人材確保は介護職員73.7%、看護師65.0%。母数は記事に記載なし。

出典 GemMed ↗

〈嚥下〉PDの呼吸と嚥下、bolus holdで改善傾向

PD20人、14回の嚥下試行。とろみが濃いほど呼吸停止が短縮。cue併用で一部の条件に有意差。小規模研究。

出典 Dysphagia ↗

〈遠隔評価〉PDの嚥下・発話を遠隔で測る技術

ウェアラブル、スマホ音響解析、AIなどを整理したレビュー。効果の統合はなく、実装の課題と空白を示す。

出典 J Parkinsons Dis ↗

〈脳卒中AI〉脳卒中リハのAI、多くは内部検証止まり

予測モデルやロボット、VRなどを整理。急性期の予後予測がリハ効果を示すわけではないと指摘。ナラティブレビュー。

出典 Cyborg Bionic Syst ↗

〈前庭リハ〉めまいの自覚は2分間歩行の短さに関連

末梢性前庭機能低下36人の横断研究。DHIと2分間歩行が関連し、客観的な前庭指標とは関連せず。因果は不明。

出典 J Neurol Phys Ther ↗

〈腰痛〉生物心理社会モデルの介入、通常PTより改善

パキスタン単施設の80人、8週。痛みMD -10.51。試験登録は2025年12月で、単施設の結果として読む。

出典 J Pain Res ↗